1914 - Zoufal Vladimír - Chorvatsko, Bosna. - Podle nekrologu Ing.Kouřila ve "Věstníku Klubu přírodovědeckého" v Prostějově, roč. 1932-1933, p.7-14 "Za † prof.Vladimírem Zoufalem", podnikal jmenovaný každoročně zájezdy do Bosny a Hercegoviny. Podnikl jich celkem 14 do počátku první světové války. Poslední cesta byla v r. 1923 do Mostaru. Cesty podnikl i do Dalmácie, Chorvatska a Sedmihradska. Jeho společníky na některých cestách byli entomologové Karel Kyselý, Teodor Wanka a Ing.Matzenauer. Přesné letopočty všech cest nebylo možno zjistit.

V úvodu k "Přehledu brouků fauny Československé republiky", Brno, 1927-1930 podává autor Dr.Antonín Fleischer přehled své celoživotní práce v entomologii. Kromě zde vypočtených cest uvádí též, že podnikl jako studující cesty do okolí Vídně a Bratislavy, později též do Biharského komitátu v Uhrách, do Istrie, Dubrovníka a na pohoří Jablanicu v Hercegovině. Neuvádí však, v kterých létech to bylo.

COSSUS TEREBRA (F.) NOVÝ DRUH MOTÝLŮ (LEPIDOPTERA) PRO ČESKOSLOVENSKO

Doposud byl Cossus terebra (F.) znám z východní Evropy, Seitz např. uvádí, že v jižním a východním Německu je zcela ojediněle, spíše se vyskytuje v Rusku při Volze. Druh je znám též ze Švýcarska, jižního Tyrolska a pak z některých východních zemí Evropy, všude zcela ojediněle. Sterneck (1929) uvádí, že dva dříve mylně publikované nálezy C.terebra jsou ve skutečnosti C.cossus (L.) Bergmann (1953) zná několik starých nálezů (před rokem 1880) ze středního Německa. Dne 18.června 1964 se podařilo Karlu Kruškovi chytit na ultrafialové světlo jednoho neolétaného samečka C.terebra v Remetských Hámrech na východním Slovensku. Rozdíly oproti C.cossus jsou zřejmé a kromě toho přinesl na srovnání Dr.R.Schwarz ze své sbírky jeden exemplář C.terebra. Motýl chycený Karlem Kruškem je však značně větší než Schwarzův pocházející z Tyrol. Podle literatury žije housenka převážně v kmenech osiky.

COSSUS TEREBRA (F.) EINE NEUE SCHMETTERLINGSART FÜR DIE TSCHECHOSLOWAKEI

In der Ostslowakei wurde die Art Cossus terebra (F.) von K.Krušek entdeckt (1 ♂ am Licht, Remetské Hámre, 18.Juni 1964). Diese Art ist neu für die Tschechoslowakei.

LITERATURA

B e r g m a n n A., 1953: Die Gross-Schmetterlinge Mitteldeutschlands 3, Leipzig/Jena (Str. 509). S t e r n e c k J., 1929: Prodromus der Schmetterlingsfauna Böhmens. Karlovy Vary.

Jiří Š m e l h a u s

K EKOLOGII PHYMATODES TESTACEUS L. (COL. CERAMBYCIDAE)

Tento ve skladištích dřeva hojný tesařík se rozmnožil v palivovém dřevě, které jsem měl uloženo v suterénní místnosti v Olomouci, sloužící k uskladnění paliva. Měl jsem tak možnost pozorovati několik let jeho ekologii a variabilitu v tomto prostředí. Jako palivové dřevo mívám uskladněno různé dřevo listnatých stromů jakož i měkké dřevo smrkové. Napadeno bylo dřevo buku, dubu, habru, jilmu, olše, břízy a třešně. Překvapilo mne však, když jsem nalezl larvy i pod kůrou smrkových polen. Zřejmě se tak stalo z dočasného nedostatku dřeva listnatých stromů, ač lipová polínka zůstala nedotčena. Nejvíce bylo napadeno dřevo bukové.

Reitter, Plavilščikov a Heyrovský ve svých pracích uvádí vývoj tohoto druhu jen ve dřevě listnatých stromů. Jedině Roubal ve svém Katalogu Coleopter Slovenska a Podk.Rusi II 1936 uvádí: Vývoj v schnoucích částech většiny listnatých i některých jehličnatých stromů.

Larva se vyvíjí výhradně pod kůrou a hlodá chodby zpola na dřevě, zpola v kůře, která vyplňuje velmi jemnou drtí. Dospělá se kuklí v jamce pod kůrou, neb proniká do dřeva, kde si vyhlodá dutinu pro zakuklení. Při přemnožení je spleť chodeb tak hustá, že na dřevě nezůstane netknuté místo a kůra odpadne. Takové dřevo nebývá již více larvami napadeno. Ve zmíněné místnosti