

DODATEK K MAŠÍNOVĚ PRÁCI O TESAŘÍČÍCH V OKOLÍ ŘEVNIC

(COLEOPTERA CERAMBYCIDAE)

Milan Sláma

Autor Bohumil Mašín v publikaci "Entomologická lokalita v Řevnicích u Prahy, charakteristika vzhledem k ochraně přírody a zjištěný výskyt druhů Coleopter Cerambycidae", uvádí celkem 47 druhů tesaříků nalezených v této oblasti. Uvedenou lokalitu mám poměrně dobře prozkoumanou a našel jsem zde kromě Mašínem uvedených druhů dalších 40 tesaříků, které on neuvádí a jejichž seznam uvádím níže.

Ze 47 druhů uvedených Mašínem jsem jich našel na uvedené lokalitě 41. Nenalezl jsem druhy: *Ergates faber* (L.), *Leptura dubia* Scop., *Molorchus umbellatarum* (Schreb.), *Anisarthron barbipes* (Schränk), *Pogonocherus ovatus* (Goeze), *Oberea oculata* (L.). Pravděpodobně za nejvzácnější druh lze v současné době považovat *Ergates faber* (L.), před mnoha lety 1930 zde hojně sbíraný Prokšem. Je možné, že se v současné době na této lokalitě již nevyskytuje.

Do seznamu Mašínem a mnou uváděných druhů je nutné doplnit i druh *Callimellum angulatum* (Schränk), nalezený Pradáčem buď přímo na této lokalitě, nebo v její blízkosti. Jde o významný nález, teprve třetí v Čechách. S tímto druhem je celkový počet zde nalezených tesaříků 88.

Toto číslo se zdá být vysoké, ale řada druhů se zde vyskytuje na nejvyšší vzácně a jsou nalézány teprve po velké námaze a často spíše náhodně. Lokalita je totiž skutečně poničena a původní skladba porostů podstatně změněna. Lze říci, že v současné době je na jih a jihozápad od Prahy řada jiných, zachovalejších lokalit, kde se tytéž druhy vyskytují většinou daleko hojněji a včetně dalších druhů zde neuváděných. Je nutno ještě podotknout, že ve skutečnosti nejde o lokalitu Řevnice, ale podle Mašínem nakreslené mapky o část svahů hřebenu Brd jižně od Řevnic. Při názvu Řevnice, by bylo nutno seznam dále rozšířit.

Seznam Mašínem neuvedených tesaříků (mimo *Callimellum angulatum*) lgt. Milan Sláma. Tabulka je provedena dle Mašína.

48	<i>Toxotus cursor</i> (L.)	smrk	6.	řídce
49	<i>Stenocorus meridianus</i> (L.)	v letu	6.	ojetině
50	<i>Cortodera humeralis</i> (Schall.)	dub	6.	řídce
51	<i>Leptura rufipes</i> Schall.	květy	6.	častě

Zprávy Čs. spol. entomol. při ČSAV, Praha, 16, 1980

52	<i>Leptura scutellata</i> F.	buk	7.	řídský
53	<i>Leptura sanquinolenta</i> L.	květy	6.-7.	řídský
54	<i>Strangalia quadrifasciata</i> (L.)	květy	6.-7.	řídský
55	<i>Strangalia revestita</i> (L.)	v letu	6.	velmi vzácný
56	<i>Strangalina attenuata</i> (L.)	květy	6.-7.	řídský
57	<i>Necydalis maior</i> L.	buk	6.	ojedinělý
58	<i>Tetropium fuscum</i> (F.)	smrk	6.	řídský
59	<i>Cerambyx scopolii</i> Füssly	květy	6.	ojedinělý
60	<i>Obrium cantharinum</i> (L.)	osika	6.	hojný
61	<i>Hylotrupes bajulus</i> (L.)	krov	7.	hojný
62	<i>Rhopalopus femoratus</i> (L.)	osika	6.	vzácný
63	<i>Pronocera angusta</i> (Kriechb.)	smrk	6.-7.	velmi vzácný
64	<i>Lioderes kollari</i> Redtb.	javor	6.	velmi vzácný
65	<i>Callidium aeneum</i> Deg.	smrk	5.-6.	hojný
66	<i>Pyrrhydium sanguineum</i> (L.)	dub	5.	velmi hojný
67	<i>Phymatodes testaceus</i> (L.)	dub	5.-6.	velmi hojný
68	<i>Phymatodes alni</i> (L.)	dub	5.	velmi hojný
69	<i>Phymatodes rufipes</i> (F.)	dubový les	5.	velmi vzácný
70	<i>Xylotrechus arvicola</i> (Oliv.)	habr	7.	řídský
71	<i>Clytus lama</i> Muls.	smrk	6.	častý
72	<i>Plagionotus detritus</i> (L.)	dub	7.	velmi vzácný
73	<i>Chlorophorus figuratus</i> (Scop.)	květy	6.	ojediněle
74	<i>Chlorophorus herbsti</i> (Brahm.)	lípa	7.	častý
75	<i>Monochamus galloprov.pistor</i> Germ.	borovice	8.	vzácný
76	<i>Mesosa nebulosa</i> (F.)	dub	6.	ojediněle
77	<i>Oplosia fennica</i> (Payk.)	lípa	7.	vzácný
78	<i>Anaesthetis testacea</i> (F.)	dub	6.	vzácný
79	<i>Pogonocherus hispidus</i> (L.)	krušina?	5.-6.	hojný
80	<i>Pogonocherus hispidulus</i> (Pill.)	habr	6.	častý
81	<i>Exocentrus lusitanus</i> (L.)	lípa	6.-7.	častý
82	<i>Agapanthia villosoviridescens</i> (D.)	kopřiva	6.	ojedinělý
83	<i>Saperda carcharias</i> (L.)	osika	požerky	řídský
84	<i>Saperda scalaris</i> (L.)	dub	5.-7.	hojný
85	<i>Oberea linearis</i> (L.)	líška	5.	vzácný
86	<i>Stenostola ferrea</i> (Schränk)	lípa	5.	hojný
87	<i>Tetrops praeusta</i> (L.)	jilm	5.	řídský
88	<i>Callimellum angulatum</i> (Schränk) (Pradáč lgt. 1972)	buk	?	?

L i t e r a t u r a

Mašín B., (rok vydání neuveden) : Entomologická lokalita v Řevnicích u Prahy, charakteristika vzhledem k ochraně přírody a zjištěný výskyt druhů Coleoptera Cerambycidae. ONV Praha - západ.

Sláma M., 1966 : Několik nálezů vzácnějších druhů tesaříků v širším pražském okolí (Coleoptera, Cerambycidae). Zprávy Čs.spol. entomologické při ČSAV, Praha, 2 : 10 - 13.

Adresa autora (Anschrift des Autors) :

Milan Sláma, U školské zahrady 3, 180 00 Praha 8.

L I T E R A T U R A

Daněk L.: Hromadný nález tesaříka Xylotrechus rusticus (Linnaeus 1758) v okolí obce Písty u Nymburka (Coleoptera, Cerambycidae). Vlastivědný zpravodaj Polabí, 1978, 18 : 12 - 15. Cena 5.-- Kčs.

Autor v tomto článku popisuje hromadný výskyt v Čechách velmi vzácného tesaříka Xylotrechus rusticus (L.) a jeho vývoj.

Zajímavý a hodnotný příspěvek je možno doporučit zájemcům o entomologii a přírodu vůbec. V časopise jsou i jiné zajímavé neentomologické články a je možno si je objednat v Polabském muzeu Poděbrady.

Milan Sláma.

Roček Zbyšek a kol.: Příroda Orlických hor a Podorlicka. Vydalo Okresní muzeum Orlických hor v Rychnově n. Kněžnou ve spolupráci s Krajským muzeem východních Čech v Hradci Králové ve Státním zemědělském nakladatelství v Praze v r. 1977. 660 str., 201 obr., cena 62.-- Kčs.

Tato obsáhlá publikace má ukázat dosavadní vývoj a současný stav přírody celé oblasti Orlických hor a Podorlicka. Je rozdělena do devíti částí, které obsahují regionální členění, vývoj mapového zobrazení, geologické poměry s přehledem nerostného bohatství, mineralogické poměry, dále geofyzikální, zeměpisné, půdní, klimatické poměry. V části botanické je zpracována skupina jätrovek, dějiny botanického průzkumu, fyto-