TESAŘÍKOVITÍ VE VÝCHODNÍ ČÁSTI CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI BÍLÉ KARPATY

BOCKKÄFER IM OSTTEIL DES LANDSCHAFTSSCHUTZGEBIETES BÍLÉ KARPATY

(COLEOPTERA CERAMBYCIDAE)

Dodatek

Květoslav Resl

Dodatek k článku Lubomíra Pospěcha, uveřejněného ve Zprávách Čs. společnosti entomologické při ČSAV číslo 4 z roku 1979,o výskytu tesaříkovitých (Cerambycidae) v oblasti Uherskobrodska, který doplňuji o 19 dalších druhů čeledi Cerambycidae.

Většina sběrů pochází z exkurzí z let 1977-1979. Sběr byl prováděn běžnými metodami. Dokladový materiál uvedených druhů je v mé sbírce.

P ř e h l e d z j i š t ě n ý c h d r u h ů

Acimerus schaefferi (Laich.) Uh.Brod,v letu nad porostem,VII., vzácný.

Cortodera humeralis (Schall.) Uh.Brod,1.6.1978,1 ex. na trávě pod kvetoucím hlohem.

Grammoptera ustulata (Schall.) Uh.Brod, na květech hlohu a svídy, IV. - VI., hojný.

Grammoptera variegata (Germ.) Uh.Brod, na květech hlohu a svídy, V., ojediněle.

Leptura rufipes Schall. Uh.Brod, na květech hlohu, V. - VI.,řídce.

Strangalia revestita (L.) Uh.Brod,sklepán z větve dubu,1 ex. 5.6.1978.

Spondylis buprestoides (L.) Uh.Brod, v letu, na borovém dříví a pařezech, VI. - VII., místy, méně hojný.

Molorchus umbellatarum (Schreb.) Uh.Brod, na květech hlohu a svídy, na suchých větvičkách ovocných stromů, především jabloní, větší množství kusů ex larvae ze suchých větviček jabloní, V. - VI.,hojný.

Callidium aeneum Deg. Uherský Brod, na dříví, VI., ojediněle.

Chlorophorus varius (Müll.) Uh.Brod, 1 ex. 28.7.1977, na květu řebříčku v sadě.

Dorcadion fulvum (Scop.) Uh.Brod, 1 ex. 22.4.1974 pod hroudou na poli.

Monochamus galloprovincialis (Ol.) ssp. pistor (Germ.) Uh.Brod, 1 ex. 15.8.1979, na sídlišti, pravděpodobně z nedalekého lesa, jedná se o dost pozdní výskyt.

Mesosa nebulosa (F.) Uh.Brod, 1 ex.na metrovém dubovém dříví,4.7.1977.

Agapanthia violacea (Fabr.) Uh.Brod, 1 ex. 23.5.1979,na trávě na úhoru při okraji lesa.

Saperda perforata (Pall.) Uh.Brod, vychováno 21 ex. ex larvae z padlého suchého topolu.

Oberea erythrocephala (Schrank.) Uh.Brod, na pryšci na úhorech při okraji lesa, VI.- VII., místy, nehojná.

Phytoecia virgula (Charp.) Uh.Brod, v letu, nad travou, na řebříčku, V. - VI., řídce.

Phytoecia nigripes (Voet.) Uherský Brod, v letu nad travou, na trávě, na úhoru při okraji lesa, V. - VI., vzácně.

Phytoecia nigricornis (F.) Uh.Brod, na vratiči,koncem VI. - počátkem VII., řídce.

Doplnění údajů o hojnosti u druhů

Stenocorus meridianus (L.) Uh.Brod, V. - VII, na květech svídy, hlohu, v letu, na podrostu, hojný.

Stenocorus quercus (Götz.) Uh.Brod, V. - VI., na květech svídy,v letu, na větvích dubu, na podrostu, hojný, ale méně něž předešlý druh.

Leptura sexguttata F. Uh.Brod, na různých květech na okraji lesa, V. - VI., hojná.

Asemum striatum (L.) Uh.Brod,,na poraženém borovém dříví, na pařezech, na stojících borovicích, V. - VI., hojný.

Tetrops praeusta (L.) Uh.Brod,na květech hlohu,na mladých listech a výhoncích ovocných stromů, především švestek, IV. - V., hojný.

Z á v ě r

Celkový počet zjištěných druhů tesaříků v oblasti Uherskobrodska je 79. Z toho 75 druhů, což je 34% druhů vyskytujících se v ČSSR, bylo zjištěno na lokalitě Uherský Brod nebo v jeho velmi blízkém okolí.

Při dlouhodobějším průzkumu a vzhledem k druhové skladbě čeledi Cerambydidae v této oblasti, předpokládám možný výskyt dalších druhů tesaříků jak na lokalitě Uh.Brod, natož pak v celé oblasti, kterou ve svém příspěvku vymezil L.Pospěch.

K zajímavým nálezům patří: Acimerus schaefferi (Laich), Strangalia revestita (L.), Saperda perforata (Pall.).

Druhová bohatost lokality Uh.Brod je dána vegetačními a klimatic-

kými podmínkami a tím, že zde dochází k přímému kontaktu xerothermních druhů na okraji lesa a na polích a druhů horských v lesích.

Příkladem toho jsou i mé nálezy horských druhů střevlíků (Carabidae) Leistus rufomarginatus Dft. nehojný, Leistus piceus Fröl.,1 ex. 20.7.1977 pod trouchnivějící dubovou větví, Cymindis cingulata Dej.pod ležícím trouchnivějícím kmenem břízy 1 ex. 4.10.1976 a Aptinus bombarda Illig. 1 ex. 20.7.1977, pod březovým polenem.

Zusammenfassung

Einen Nachtrag zum Aufsatz von Lobomír Pospěch über das Vorkommen der Cerambyciden in der Umgebung von Uherský Brod bildet die Feststellung von 19 weiteren Arten. Als interessant ist das Vorkommen von Akimerus schaefferi (Leich.) , Strangalia revestita (L.) und Saperda perforata (Pall.) zu erwahnen.

تـلخـيص

اضافة الى مـقال السيد / لوبومير بـوسبيـخ حول وجود القرنـيـل ـ في منـطقة (اوهيرسكي بـرود) يذكر المؤلف وجود ١٩ نوعا جـديدا غير ما ذكره المؤلف السابق الذكر فى هذه الفصيلة ومـمـا يجـدر الذكر هو جود وكـل من Akimerus schaefferi (Leich.), Strangalia revestita (L.), Saperda perforata (Pall.).

Literatura

Heyrovský L., 1955: Tesaříkovití, Fauna ČSR. ČSAV, Praha.
Kult K., 1947: Klíč k určování brouků čeledi Carabidae Československé republiky, Praha.

Adresa autora (Anschrift des Autors) :
Ing. Květoslav Resl, Luhanova 1824, 688 01 Uherský Brod.