
PARANEMAPOGON FUNGIVORELLUS (BEN.) - NOVÝ DRUH PRO ČSSR

Lepidoptera Tineidae

Petr Pipek

Paranemapogon fungivorellus (Benander 1939) se vyskytuje v severní a střední Evropě (Švédsko, Polsko, NDR, Rakousko), evropské části SSSR a na Krymu. Petersen (1965) předpokládá výskyt tohoto druhu i v ČSSR, protože byl zjištěn v sousedním Slezsku, Sasku a Dolních Rakousích.

V loňském roce se podařilo autorovi vypěstovat z choroše Daedalea quercina (L.), nalezeného 6.4.1980 na dubovém pařezu v Karlickém údolí (okres Praha-západ), 23 imag P.fungivorellus (Ben.); motýli se líhli ve dnech 20.4. - 1.5.1980.



Vypěstované exempláře byly spolehlivě determinovány podle habituálních znaků, v jednom případě (♀) byla provedena determinace podle genitálií. Typický tvar prevaginální destičky (viz obr.) potvrdil, že jde o P.fungivorellus.

P.fungivorellus (Ben.) má světle žlutošedá přední křídla s kresbou sestávající z hnědých čárek a skvrn, zadní křídla jsou tmavě šedá. Motýl se vyskytuje v listnatých lesích. Housenka žije v choroších nebo hnijícím dřevě. Housenky přezimují a kuklí se v květnu; imaga se líhnou v přírodě v červnu.

Zusammefassung

Paranemapogon fungivorellus (Ben.) - eine neue Art für ČSSR. P.fungivorellus wurde aus Raupen in Baumschwamm Daedalea quercina von Karlické údolí (Kreis Praha-West) aufgefütert.

Literatura

Zagiljajev A.K., 1964: Fauna SSSR, Češuekrylye, IV/2, Nauka Moskva.

Petersen G., 1965: Beitrag zur Kenntnis der Tineiden der Tschechoslowakei, Acta faun. ent. Mus. Nat. Pragae, 11 : 165 - 166.

Adresa autora (Anschrift des Autors) :

Ing. Petr Pipek, Široká 22, 110 00 Praha 1.