OPRAVA KE KNIZE "KLÍČ K URČOVÁNÍ ČS.KRASCŮ"

Svatopluk Bílý

V "Klíči k určování čs. krasců" (Academia, Praha, 1977) došlo při sazbě na stránce 18 k vynechání první téze v klíči druhů podrodu Dicerca s.str. a tím i k posunutí ostatních tézí a antitézí.

V následujícím textu uvádím správné znění klíče druhů podrodu Dicerca.

1 (4) Krovky na konci silně protažené, mírně rozbíhavé, konce krovek zaokrouhlené, nejvýše s velmi malým, vnitřním zoubkem (obr. II, 1);

2 (3) Hlava se silným podélným vtlakem; střední, podélný žlábek na štítu velmi slabý; štít téměř 2x širší než dlouhý; krovky 2x delší než široké; zavalitý druh, tvarem těla podobný D.aenea; 15.0 - 20,0 mm;
vývoj neznámý; zatím je znám jediný starý nález z Čech .... D. amphibia Mars.

3 (2) Hlava bez podélného vtlaku; střední žlábek na štítu silně vyvinut; štít pouze 1,5x širší než dlouhý; krovky 2,5x delší než široké; štíhlý druh; 14,0 - 22,0 mm;
vývoj v břízách; v celém území ve starých březových porostech; tab. II, obr. 2
..... D. furcata (Thunbg.) (= D. acuminata (Pall.) ++

4 (1) Krovky na konci mírně protažené, nerozbíhavé, konce krovek vykrojené, každá krovka s vnějším a vnitřním zubem (obr. II, 2)

5 (6) Zavalitý druh s krovkami pouze 2x delšími než širokými;mezirýží krovek bez vystouplých, tmavých a lesklých plošek; střední holeně samce se slabým a tupým zubem (obr. I, 19);
18,0 - 24,0 mm;
vývoj v topolech; staré nálezy známé z celého území, nyní zřejmě již jen na jižním Slovensku; tab. II, obr. 3 .... D. aenea (L.)

6 (5) Štíhlejší druhy s krovkami 2,5x delšími než širokými:, krovečná mezirýží s malými, tmavými a lesklými, vystouplými ploškami; střední holeně samců se silným zubem (obr. I, 18)

7 (8) Štít se zřetelným, podélným vtlakem uprostřed;,krovky s hrubou strukturou a se zřetelnými rýhami; hladké plošky v mezirýžích silně protáhlé a vystouplé; 16,0 - 23,0 mm;
vývoj v olších, ale i v břízách a habrech; řídce na Moravě i na Slovensku; z Čech je mi znám jen jediný, starý nález; tab. II, obr. 4 .....
..... D. alni (Fisch.)

8 (7) Podélný vtlak na štítu se rozpadá na dvě prohlubeniny; jedna slabá před kořenem štítu a druhá silnější v přední polovině, krovky s jemnou strukturou, rýhy nezřetelné, splývající se základní strukturou krovek; hladké plošky v mezirýžích mírně protáhlé, teměř nevystupující; 19,0 - 25,0 mm;
vývoj téměř ve všech našich listnatých stromech, především však v habru; na celém území na zachovalých biotopech; tab. II, obr. 5 .....
..... D. berolinensis (Herbst)

++ viz Zprávy Čs.spol.entomol. při ČSAV r.1980

Adresa autora (Anschrift des Autors) :

RNDr. Svatopluk Bílý CSc., Na baště sv. Ludmily 1, 160 00 Praha 6.