NĚKTERÉ NOVÉ NÁLEZY TESAŘÍKŮ PRO ČECHY

(COLEOPTERA CERAMBYCIDAE)

Jan Sobota

Ve svém příspěvku bych se chtěl zmínit o několika nových nebo nově potvrzených nálezech tesaříků pro území Čech.

Bezpochyby novým druhem je Leptura tesserula Charp. První nálezy byly hlášeny bez udání podrobností z okolí Třebechovic p.Orebem v roce 1975 a 1976.V posledních letech se podařilo několika entomologům potvrdit výskyt tohoto druhu v Čechách.

Přehled nálezů: Hradec Králové - Krňovice, VII.1980, 1 ex. RNDr.J.Lauda lgt.
Holice - Na hranicích, 7.VIII.1980,1 ex. Rychlík lgt.
Vysoké Chvojno, 29.VII.1981, 1 ex. J.Sobota lgt.

Všechny imaga byla chycena na okoličnatých rostlinách. Podle dosavadních nálezů lze uvažovat o rozšíření v oblasti Novohradeckých lesů - od Hradce Králové až k Chocni, protože se jedná prakticky o souvislý lesní komplex. Nezle pochopitelně jednoznačně rozhodnout,zda jde o zavlečený a zdomácněný druh nebo o původní rozšíření. Podle Heyrovského je nejbližší výskyt druhu Leptura tesserula v oblasti Slezských Beskyd V okolí Hradce Králové jsou nacházeny druhy teplomilné - např. Clytus tropicus Panz., Plagionotus detritus (L.), Phytoecia icterica (Schall.) i podhorské - např. Leptura dubia Scop., Leptura sanquinolenta L.,Gaurotes virginea (L.), Monochamus sutor (L.), Clytus lama Muls.

Dalším druhem, nyní poměrně hojným ve východních Čechách, zejména na teplejších lokalitách je Exocentrus adspersus Muls. Heyrovská jej pro Čechy neuvádí.(Morava: Val.Klobouky, Valtice, Čejč, Střeň, Nebuz). Exocentrus adspersus je pravděpodobně rozšířen i v jiných oblastech v Čechách,* zejména na teplých lokalitách v zachovalejších porostech dubu.

Přehled nálezů: Chlumec n.Cidl., ex larvae 1970, 2 ex., J.Sobota lgt.
Lišice, ex larvae 1975, 1976, více kusů,J.Sobota lgt.
Poděbrady, ex. larvae 1979, 3 ex., J.Sobota lgt.
Choťovice, 12. VI. 1979, 2 ex., J.Sobota lgt.
Jaroslav, ex larvae 1979, více lusů,J.Sobota lgt.

Výskyt druhu Nivellia sanquinosa (Gyll.) v Čechách zůstává stále problematický. Údaje Heyrovského - Vosov a Slezsko (Reitter), byly rozšířeny o okolí Nižboru a podle Poláčka (Listy Orlického muzea 1969) byl

tento tesařík nalezen O.Markem 10.VII.1941 v údolí Orlice - Brandýs n. Orlicí a Ústí n.Orlicí.

Další nález z této oblasti Choceň-Peliny, 21.VII.1976,F.Čapek lgt. dává určitou naději o potvrzení rozšíření tohoto druhu.

S o u h r n

Tesaříkovití jsou jednou z nejvíce sledovaných čeledí Coleopter. Přesto i zde zákonitě dochází k novým poznatkům nejen z hlediska bionomie, ale i rozšíření jednotlivých druhů. V poslední době jsme bohužel svědky především úbytku lokalit jednotlivých druhů. Charakteristickým příkladem je Cerambyx cerdo Lin., který prakticky ve Východních Čechách vyhynul. Tento osud očekává v průběhu příštích let při stejném vývoji řadu dalších druhů.

L i t e r a t u r a

Heyrovský L., 1955: Tesaříkovití - Cerambycidae, Fauna ČSR, NČSAV, Praha.

Poláček K., 1969: Několik zajímavějších nálezů brouků z východních Čech, Listy Orlického muzea str. 156 - 162.

Sobota J., 1974: Tesaříkovití (Coleoptera - Cerymbycidae) "Žehuňské obory" u Chlumce nad Cidlinou. ACTA MUSEI REGINAEHRADECENSIS XV.

Šimeček J., 1977: Tesaříkovití v Novohradeckých lesích ve východních Čechách, Zprávy Čs. společnosti entomologické při ČSAV.

Adresa autora :

Jan Sobota, Baarova 1374, 500 02 Hradec Králové.

---

* Poznámka redakce : Bohemia centr. Nižbor