

NOVÉ A ZAJÍMAVÉ NÁLEZY DRABČÍKOVITÝCH Z ČESKOSLOVENSKA 2
NEW AND INTERESTING FINDS OF STAPHYLINIDAE FROM CZECHOSLOVAKIA 2

(COLEOPTERA, STAPHYLINIDAE)

Jaroslav Boháč

Práce navazuje na moji předcházející faunistickou práci (Boháč, 1979 b). Kromě údajů z vlastního materiálu a z materiálu determinovaného jiným sběratelům (Strejček, Karas, Adámek, atd.) jsem zde zařadil i údaje některých zahraničních autorů, vztahující se na naše území (Coffait, 1979; Smetana, 1973). Zároveň opakuji některé své jinde publikované údaje (Boháč, 1979, 1980). U několika druhů, které byly dříve, vzhledem k nedostatečnému faunistickému průzkumu, považovány za relativně velmi vzácné a kde je již dnes dostatek údajů, jsem se pokusil o zhodnocení jejich výskytu na našem území. U těchto druhů jsou zařazeny mapky výskytu.

Za determinaci druhů rodu *Stenus* Latr. děkuji panu L. Hromádkovi, podčeledi *Xantholininae* J. Janákovi, *Quedius* Steph. J. Mackovi a *Aleochara* Grav. RNDr. Z. Likovskému, CSc. Pokud není uvedeno jinak, jsou dokladové kusy v mé sbírce. Údaje o celkovém rozšíření jsou převzaty z prací Horiona (1963, 1965, 1967), Smetany (1958) a dalších.

Micropeplus tesserula Curt. - Bohemia B.: Adršpach, 20.5.1977

1 ex. (lgt. coll. Macek); Moravia b.: Mohelnice, 8.1978 1 ex. (Adámek lgt.). Druh je znám ze střední Evropy jen z podhorských lesních oblastí, faunistických údajů málo.

Micropeplus marietti Duv. - Bohemia b.: Adršpach, 3.10.1977 1 ex. (Macek lgt.); Bohemia m.: Třeboň, 14.10.1978 1 ex. (Pižl lgt., coll. Přír. fakulta UK, Praha). Druh je rozšířen v jižní Evropě a v jižní části Evropy střední. Faunistických údajů málo (Bohemia: Roubal, 1945; Moravia: Scheerpeltz, 1933; Slovakia: Roubal, 1930, Smetana, 1957).

Thoracophorus corticinus Motsch. - Bohemia c.: Praha-Císařský ostrov, 5.2.1971 více ex. v dutém topolu s mravenci (Strejček lgt.). Druh je vázán na staré duté stromy s mravenci rodu *Lasius*. Charakteristický pro přírodně zachovalé oblasti, staré parky a pod. Z Čech

Zprávy Čs. společnosti entomologické při ČSAV, Praha, 18, 1982

znám z okolí Prahy (nověji Strejček, 1973), ze Šumavy (1 ex. s lokalitou Smrk, coll. NMP). Ze Slovenska znám ze Zvolena (Olexa lgt.).

Megarthus affinis Mill. - Moravia m.: Adamov, 4.1967 2 ex. (Hladil lgt.).

Druh je znám ze západní, střední a jižní Evropy, severní Afriky a Sibiře. Z Československa málo faunistických údajů.

Megarthus nitidulus Kr. - Bohemia or.: Vrchlabí, 3.7.1974 1 ex.; Žamberk, 30.5.1975 1 ex. (Marek lgt.). Rozšířen v severní a střední Evropě. Smetana (1964) udává druh ze Soosu, z Moravy a Slovenska jen starší údaje Fleischera (1927) a Roubala (1930).

Eusphalerum ophthalmicum Payk. - Bohemia c.: Praha, 12.12.1971, 1 ex. (Táborský lgt.); Praha-Vinořský park, 26.6.1978 více ex. (Strejček lgt.); Stříbrná Skalice, 1973 více ex. (Jindra lgt.); Slovakia occ.: M.Fatra-Vrátna dolina, 15.6.1971 více ex. (900-1000m) (Strejček lgt.); Slovakia m.: Muráň, 7.71 hojně na květech okoličnatých rostlin; Čenkov, 7.1968 1 ex. (Marek lgt.); Zádiel, 10.7.1972 více ex. (Král lgt.). Druh je rozšířen v západní, střední a severní Evropě. U nás udáván z horských údolí (Roubal, 1930; Horion, 1963). Patrně více rozšířen.

Phyllodrepa linearis Zett. - Slovakia or.: Mihalovo, 10.1978 1 ex. (Adámek lgt.). Druh rozšířen v severní a střední Evropě. Z Čech znám ze Šumavy (Boubín, Lokay lgt., coll. NMP), z Moravy z Beskyd (nověji Nohel, 1971), ze Slovenska z Vysokých a Nízkých Tater (Roubal, 1930), Vtáčniku (Havelka, 1964).

Omalius rugatus Rey - Bohemia b.: Krkonoše-Kotelné jámy, 30.8.1979 2 ex. v prosevu nad horní hranicí lesa společně s Othius melanocephalus Gr., Domene scabricollis Er., Atheta tibialis Heer, Aleochara rufitarsis Heer, (Boháč a Strejček lgt.); Slovakia or.: Remetské Hámre, 22.5.1975 1 ex. (Werner lgt.). Druh je málo znám, protože dříve udáván jako synonymum k Omalius caesus Gr. Z Čech je znám ze Šumavy a Krkonoš, ze Slovenska z více horských lokalit (Smetana, 1966). Mapa rozšíření obr. 2.

Omalius excavatus Steph. - Bohemia m.: Šumava.Čertovo jezero, 22.4.1979 1 ex. na břehu pod kamenem (Fencel lgt.). Z Čech jsou známy starší nálezy (Krkonoše-Špindlerův mlýn, Rodt lgt.; Hvězda u Prahy, Rodt lgt., coll. NMP), z Moravy uvádí Fleischner (1927) ze Slezska, Roubal (1930) z hor Slovenska.

Phloenomus lapponicus Zett. - Bohemia c.: Černošice, 27.3.1976 2 ex.

pod borovou kůrou (Zbuzek lgt.); Bohemia or.: Ústí n.O., 17.5.1975 1 ex. (Adámek lgt.); Moravia b.: Šternberk, 10.3.1973 3 ex. (Adámek lgt.).

Philorinum sordidum Steph. - Slovakia m.: Júr u Bratislavy, 5.1965 1 ♂ (Rous lgt.).

Druh je rozšířen v západní a jižní Evropě, místy zasahuje do západní části střední Evropy (Rakousko). Západní část severní Afriky, Madeira. Na xerothermních stanovištích a tam na *Sarothamus scoparius*, *Ulex*, *Cytisus*, *Genista*. I v prosevech na těchto místech. Doba výskytu květen až červen. Nový rod a druh pro Československo. Nález dalších kusů by byl velmi zajímavý.

Lathrimaeum melanocephalum Illig. / Bohemia or.: Králíky, 1 ex. (Novotný lgt.); Moravia: Horní Blatná, 6.1950 1 ex. (Hladil lgt.); Slovakia or.: Mihalovo, 10.1978 1 ex. (Adámek lgt.). Vzácný druh z hor severní a střední Evropy.

Geodromicus nigrita danieli Smet. - Slovakia or.: Zbince pr. Michalovce, 1954 1 ex. Málo známý nedávno popsáný poddruh.

Coryphium angusticolle Steph. - Bohemia c.: Lány, 8.6.1975 1 ex. (Werner lgt.). Rozšířen v severní a střední Evropě a Itálii. Z Čech málo údajů.

Coryphium letzneri Schwarz - Bohemia occ.: Slavkovský les-Holiny pr. Kynžvart, 24.8.1978 1 ex. v podsevu (Fagetum). Výskyt tohoto druhu velmi málo znám.

Oxytelus inustus Grav. - Bohemia c.: Praha-Suchdol, Tiché údolí, 26.3.1973 3 ex. v suchém ovčím trusu (Strejček lgt.). Druh je rozšířen v jižní části palearktické oblasti. Z Československa málo údajů.

Platystethus alutaceus Thoms. - Bohemia c.: Praha-Bráník, 14.12.1977, 1 ex. v náplavu Vltavy (Werner lgt.); Praha-Suchdol, 29.4.1975 1 ex. (Jindra lgt.); Neveklov, 20.8.1966 1 ex. (Zbuzek lgt.); Loučeň, 5.1963, 1 ex. Evropa, Středomoří. Z našeho území málo znám.

Platystethus capito Heer - Bohemia c.: Praha-Suchdol, 29.4.1975, 22.6.1975 více ex. (Jindra lgt.); Libřice, 12.7.1952. Jihopalearktický druh, u nás sporadicky a málo znám.

Stenus sylvester Ev. - Bohemia c.: Čelákovice, 5.1959 1 ex. (Skřivan lgt.). V Československu jen starší údaje.

- Stenus rogeri Kr. - Slovakia m.: Volovec, 1000 m, 29.7.1956, více ex., Kováčov, 6.65 1 ex. Druh je rozšířen ve střední Evropě (s.lat.). Ze Slovenska známy jen dva starší údaje Roubalovy (1930).
- Stenus palposus Zett. - Bohemia c.: Čelákovice-Jiřina, 25.4.1920. 1 ex. Z Československa známo jen několik starších faunistických údajů.
- Stenus ruralis Er. - Bohemia c.: Šlechtín pr. Ledeč, 1977 1 ex. (Flegr lgt.). Druh je znám ze Sudet, Beskyd a Karpat.
- Stenus nitens Steph. - Bohemia: Litovice, 4.1968 1 ex. (Hrozinka lgt.); Hostivice, 2.5.1965 1 ex. (Rous lgt.). Severní a střední Evropa, Sibiř. V Československu vzácný.
- Stenus misael Bondroit - Slovakia m.: Petržalka, 12.10.1946 2 ♀ (Depta lgt.); Slovakia c.: Banská Bystrica, 1925 1 ♂ (Roubal lgt.). Všechny ex.coll.Hromádka a SNM, Bratislava. Druh byl hlášen jako nový pro naše území (Boháč, 1979 d).
- Stenus picipennis Er. - Bohemia c.: Šlechtín pr. Ledeč, 5.1975 více ex. (Flegr lgt.); Praha-Nautonice, 5.1975 2 ex. (Flégr lgt.); Dobříchovice, 10.9.1961 1 ex.; Bohemia b.: N.Dvůr u Lenešic, 28.7.1979 1 ex. vyšlapováním na břehu rybníka. Západoevropský druh, u nás znám jen z Čech a Slovenska (zde mnohem vzácněji).
- Paederus balcanicus Koch - Moravia m.: Břeclav, 9.1933, 2 ex. (Kodym lgt., coll.NMP); Valtice, 14.6.1934 1 ex. (Kodym lgt., coll.NMP). Druh byl hlášen z těchto lokalit jako nový pro Moravu (Boháč, 1979). Smetana (1964) ohlásil jako nový pro ČSR ze Slovenska,
- Rugilus mixtus Lohse - Bohemia or.: N.Ves, 30.6.1977 1 ex. (Poláček lgt.); Opočno, 23.6.1979 5 ex. na Polyporus squamosus (Likovský lgt.); Bohemia m.: Chlum u Třeboně, 8.8.1971 2 ex. (Horák lgt.). Druh je rozšířen ve střední a jihovýchodní Evropě. Na základě dosavadního faunistického průzkumu lze konstatovat, že je vázán na původní bukové lesy, zejména v podhorských oblastech. Mapa s údaji o rozšíření na území ČSR viz obr. 2.
- Medon ripicola Kr. - Bohemia b.: Markousovice, 10.5.1975 1 ex. (Macek lgt.). Druh je rozšířen v západní a jižní Evropě. Z Čech znám jeden údaj (Horion, 1965).
- Scopaeus bicolor Baudi - Moravia m.: Břeclav, 6.7.1975, 4 ex. na břehu tůně. Druh byl z této lokality ohlášen jako nový pro ČSR (Boháč, 1979). Rozšířen v jihovýchodní Evropě a na Kavkaze. Z Maďarska známo několik nálezů (Tóth, 1979).

Scopaeus pusillus Kiesw. - Moravia m.: Adamov, 4.1968 1 ♀. Druh je rozšířen v jižní a střední Evropě. U nás sporadicky.

Lathrobium sodale Kr. - Slovakia or.: Kříže, 16.6.1978 1 ex. (Adámek lgt.). Rozšířen v jižní Evropě a v jižní části Evropy střední. Na Slovensku udáván v současné době z několika lokalit (Gottwald, 1965; Havelka, 1964). Velmi vzácný ripicol.

Lathrobium ripicola Czwal. - Bohemia c.: Pyšely, 26.5.1955 1 ex. (Tichý lgt.); Moravia m.: Pálava, 1 ex. v náplavu Dyje (Volák lgt.); Slovakia m.: Kamenný Most, 3.5.1955 2 ex.; Slovakia or.: V.Trakany, 1 ex. (Švihla lgt.). Středoevropský druh (s.lat.), M. Asie. Z našeho území málo faunistických údajů.

Lathrobium castaneipenne Kol. - Bohemia c.: Praha-Suchbát, 30.3.1976 1 ex. (Zbuzek lgt.); Roudnice, 6.5.1976 1 ex. (Kovář a Ježek lgt., coll.NMP); Moravia m.occ.: Jemnice, 11.5.1976 1 ex. (Kačenka lgt.). Druh je znám ze střední Evropy, Kavkazu, Malé Asie a Sibiře. Z Československa velmi málo údajů.

Lathrobium crassipes Muls. Rey - Bohemia c.: Vrané, 15.3.1916 1 ex. (Rambousek lgt., coll.NMP); Kačina, 24.3.1909 1 ex. (Rambousek lgt., coll.NMP); Červená, 10.7.1905 1 ex. (Coll.NMP). Druh je rozšířen v jižní Evropě a v jižní části Evropy střední. Z našeho území znám pouze z jižního Slovenska (Roubal, 1933; 1941). Nový pro Čechy.

Metoponcus brevicornis Er. - Moravia m.: Adamov, 4.1968, 8.1971 4 ex. (Hladil lgt.). Ponticko-jihovýchodoevropský druh. Poslední údaje jen dle Smetany (1958).

Megalinus glabratus (Muls.Rey) - Bohemia c.: Slaný, 22.7.1977 1 ex. (Váša lgt.); Bohemia or.: Lomnice n.P., 4.1978 více ex. v kompostu (Zahradník lgt.); Vysoké Mýto, 26.9.1976 1 ex. (Poláček lgt.). Druh je považován za velmi vzácný (Smetana, 1958). Pravděpodobně je však u nás více rozšířen a uniká pozornosti sběratelů pro svůj synantropní charakter (Uhlig, 1977).

Xantholinus audrasi Coiffait - Bohemia c.b.: Blata, 5.6.1976 1 ex. (Kačenka lgt.). Rozšíření málo známo.

Xantholinus roubali Coiffait - Bohemia c.b.: Hrdějovice, 16.8.1975 1 ex. (Kačenka lgt.); Praha-Bráník, 14.12.1974 1 ex.; Bohemia b.: Ústí n. Lab.-Střekov, 1.1953 1 ex. v náplavu Labe (Strejček lgt.); Čepirohy pr. Most, 13.3.1977 1 ex. (Borovec lgt.); Moravia m.: Mutěnice, 15.11.1974 1 ex. (Kačenka lgt.). Z našeho území málo faunistických údajů.

jů, některé poslední uvádí Janák (1978).

Xantholinus meridionalis Nord. (=jarrigei Coiff.). - Bohemia c.b.: Mšené, 20.6.-17.7.1975 1 ex. (Jindra lgt.); Helvíkovice, 12.8.1972 1 ex. (Resl lgt.); Moravia m.occ.: Telč, 7.7.1972 1 ex. (Švec lgt.). Z našeho území málo faunistických údajů.

Othius laeviusculus Steph. - Bohemia c.: Rožmitál p. Třemšínem, 3.8.1974 1 ex. na louce u rybníka (Strejček lgt.). Druh je rozšířen v západní a jižní Evropě a zasahuje až do jižních částí střední Evropy. Z Československa jediný novější údaj.

Erichsonius subopacus Hochh. - Bohemia c.: Hostivice-Břve, 25.3.1973 1 ex. v podsevu u rybníka (Strejček lgt.). Další nález tohoto málo známého druhu.

Philonthus mannerheimi Fauv. - Bohemia m.: Předboř pr. Tábor, 17.7.1972 1 ex. (Švec lgt.); Slovakia b.: N.Tatry-Donovaly, 6.1973 1 ex. (Rath lgt.); Slovakia m.: Margecany, 3.8.1974 1 ex. (Švihla lgt.). Ubývající druh, vázaný na okolí vod, bažinaté louky a podobně.

Philonthus ochleatus Scheerp. - Slovakia m.: Zadiel, 6.7.1969 1 ex. (Marek lgt.). Druh je znám v jižní a střední Evropě, západní části severní Afriky a Malé Asie. Z Československa zatím znám jen ze Slovenska.

Philonthus corvinus Er. - Bohemia m.: Veselí n.Luž.-Drahov, 4.8.1973 1 ex. (Karas lgt.). Rozšířen v severní a střední Evropě. Ekologicky velmi náročný druh, tyrphophil.

Philonthus diversiceps Bernh. - Moravia m.: Pavlov, 4.1975 1 ex. (Ernest lgt.); Slovakia m.: Čata, 6.1975 1 ex. (Ernest lgt.). Druh je rozšířen v jižní Evropě a v jižních částech Evropy střední, na Kavkaze, Zakavkazsku a v Turkestanu. Jako nový pro naše území byl hlášen Löblem (1960) z východního Slovenska. Z Moravy byl hlášen jako nový z uvedené lokality Boháčem (1979 a).

Gabrius lividipes Baudi - Bohemia c.: Sadecká, 7.5.1977 1 ex. (Ernest lgt.); Slovakia b.: Bardejov, 5.1976 2 ex. (Ernest lgt.). Z našeho území velmi málo faunistických údajů.

Staphylinus latebricola Grav. - Bohemia c.: Praha-Suchbát, 22.6.1973 1 ex. (Jindra lgt.); Bohemia b.: Prachovské skály, 16.6.1975 1 ex. (Švec lgt.). Vzácný a sporadický druh.

Ocypus ophthalmicus (Scop.) - Bohemia c.: Rožmitál, 8.1917, 1 ex. (coll.

NMP); Bohemia occ.: Karlovy Vary, 1 ex. (coll.NMP); Slovakia occ.: Malacky, 4.8.1973 1 ex. (Hladil lgt.); Žilina-Strečno, 2.9.1977 1 ex. (Bejšák lgt.). Vzácný druh, známý hlavně ze Slovenska a jižní Moravy. Starší nálezy z Čech by měly být dalším popudem k faunistickému průzkumu.

Ocypus brunripes (F.) - Bohemia b.: Litoměřice, 4.1977 více ex. pod kameny na lesostepi (Moravec lgt.). Málo známý druh.

Ocypus biharicus (J.Müll.) - Moravia m.: Adamov, 6.1970 1 ex. (Hladil lgt.); Slovakia or.: Petrovce, 1 ex. (Marek lgt.). Druh je rozšířen v jihovýchodní Evropě, kde zcela nahrazuje *Ocypus tenebricosus* Grav. Např. v Maďarsku, *Ocypus tenebricosus* Gr. jen v nejzápadnější části území a velmi sporadicky (Tóth,1979). Smetana (1958) uvádí z našeho území jen tři nálezy. Z poslední doby více údajů (Havelka,1964; Dvořák,1965,1967; Boháč,1972). Druh je rozšířen na teplých lokalitách jižního, středního a východního Slovenska, jižní Moravy a podél toků velkých řek proniká i dále na sever a velmi vzácně až do Čech. Zde hlavně *Ocypus tenebricosus* Gr. Mapa rozšíření druhu obr. 1.

Ocypus pedator Grav. - Bohemia c.: Mšené, 20.6.1975 1 ex. (Jindra lgt.); Bohemia or.: Č.Třebová, 1 ex. (Syrovátka lgt.,coll.NMP); Bohemia b.: Žatec-Stankovice, 13.10.1974 20 ex. (Strejček lgt.); Č.Středohoří-Habří vrch-Ráč, 25.6.1977 1 ex. (Strejček lgt.). Druh je dobrým indikátorem pro nejteplejší místa našeho území. Sporadicky termophil.

Ocypus compressus Nordm. - Bohemia c.: Praha-Krč, 1 ex. (Lokay lgt.,coll.NMP); Praha-Cibulka, 1907 1 ex. (Mulač lgt.,coll.NMP); Bohemia or.: Kost, 3.9.1950 1 ex. (coll.NMP); Moravia: Rovečín; Adamov 2 ex. (Fleischer lgt.,coll.NMP); Slovakia or.: Vrbové 1 ex. (Kočí lgt.,coll.NMP); Obyšovice 1 ex. (Machulka lgt.,coll.NMP). Záměrně uvádím i starší nálezy tohoto málo známého druhu. Smetana (1958) ani další autoři tento druh z Čech neuvádějí. Nový pro Čechy.

Ocypus winkleri Bernh. - Bohemia c.: Praha-Strašnice, 29.5.1976 1 ex. (Kačenka lgt.); Praha-Žižkov 1 ex. (coll.NMP); Bohemia b.: Libčeves pr.Most, 29.7.1979 1 ex. na lesostepi; Měrunice pr.Most, 29.7.1979 2 ex. na lesostepi; Stroupeč pr.Žatec, 4.1978 2 ex. na lesostepi; Č.Středohoří: Boreč-vrchol, 18.3.1955 (Strejček lgt.); Vysočany pr.Žatec, 2.9.1969 1 ex. (Mlynář lgt.); Stankovice pr.Žatec, 13.10.74 1 ex. na ruderalu (Strejček lgt.); N.Sedlec pr.Žatec, 23.4.1969 1 ex. (Mlynář lgt.); Bohemia m.: Prachatice, 22.5.1938 (Tanzler lgt.,

coll.NMP); Němá strouha, 19.4.1900 (coll.NMP); Moravia: Prostějov, 1 ex. (Kouřil lgt., coll.NMP). Smetana (1958) uvádí z našeho území jen 2 lokality. Dvořák (1962) uvádí z Čech další 3 lokality, Boháč (1979b) další 3. Na základě současného faunistického výzkumu lze uzavřít, že tento druh je rozšířen na celém našem území na xerothermních lesostepních lokalitách. Mapka rozšíření obr. 1.

Quedius curtipennis Bernh. - Bohemia c.: Praha-Troja (Haltýře), 7.6.1979 1 ex. (Strejček lgt.); D. Bezděkov, 17.6.1971 1 ex. (Mařík lgt.); Moravia m.: Hodonín, 5.1975 2 ex. Málo známý druh, který je rozšířen především na xerothermních lesostepních lokalitách. Vikariantní druh ke Quedius fuliginosus (Grav.).

Quedius unicolor Kiesw. - Bohemia m.: Horská Kvilda, 11.8.1973 1 ex. (Boháč a Kačenka lgt.). Vzácný druh hor střední Evropy. Ze Šumavy naposled uvádí Smetana (1962).

Quedius balticus Korge - Bohemia b.: Břvany pr. Most, 28.7.1979 11 ex. vyšlapáváním na břehu vypuštěného a zarostlého rybníka (Boháč a Strejček lgt.); Zaječice pr. Most, 18.8.1979 1 ex. pod hroudami zasolené půdy (Boháč a Strejček lgt.). Tento nedávno od nás ohlášený druh je zatím znám ze severozápadních Čech a od Prahy. Je to západoevropský slanomilný druh. Lze předpokládat výskyt i na některých lokalitách v Polabí. Mapka rozšíření obr. 1.

Quedius picipes Mannh. - Bohemia b.: Č. Středohoří-Boreč, 24.3.1957 1 ex. na vřechu (Strejček lgt.). V Čechách vzácně.

Quedius limbatus Coiffait - Coiffait (1978) uvádí tento druh z Československa bez bližších údajů. Druh se liší od Quedius limbatus Heer štíhlejším a paralelnějším tělem, kratšími krovkami a menší hlavou. Aedeagus s paramerou, jejíž šířka je po celé délce menší než šířka středního lůbu.

Quedius paralimbatus Coiffait (=sublimbatus Coiffait) - Coiffait (1979) uvádí z Rakouska (okolí Vídně). Nález na našem území velmi pravděpodobný. Od Quedius limbatus Heer se liší robustnějším tělem a hlavou širší než delší (šířka ve spánkových rozích). Aedeagus se středním lůbem kratším než paramera, která je velká.

Quedius nemoralis Baudi - Bohemia b.: Oleško pr. Hrdly, 25.8.1972 1 ex. na písčíně (Strejček lgt.); Bohemia m.: Domažlice 1 ex. V Čechách vzácný druh.

Trichophya pilicornis Gyll. - Slovakia occ.: M.Fatra-Baba, 29.5.1978
prosev ve Fagetu 1 ex. (Strejček lgt.). Na našem území jen velmi
vzácně a sporadicky.

Mycetoporus monticola Fowl. - Bohemia m.: Šumava-Černé jezero, 10.7.1978
1 ex. na břehu jezera pod kamenem (Fencel lgt.); Bohemia b.: Krkono-
še-Kotelné jámy, 20.8.1979 více ex. v prosevu na horní hranici lesa
a v ledovcovém karu (Boháč a Strejček lgt.). Boreomontánní druh, roz-
šířený v severní části palearktické oblasti. U nás vzácně v subal-
pinních polohách.

Mycetoporus niger Fairm. - Bohemia c.: Doubravčice, 8.1961 1 ex. (Hro-
mádka lgt.); Želivka-Sedlice, 18.7.1967 1 ex. (Strejček lgt.); Bo-
hemia m.: Šumava-Volary (Stožec), 10.7.1969 1 ex. v podsevu (Strej-
ček lgt.). Severopalearktický druh, v Čechách vzácný.

Mycetoporus corpulentus Luze - Moravia occ.: Žďárn.Sáz.-Žákova hora, 7.
1972 2 ex. (Hromádka lgt.); Slovakia or.: V.Kapušany, 24.7.1973 1
ex. u Latorice. Montánní druh jižní Evropy a jihovýchodní části Ev-
ropy střední. U nás je znám z Vihorlatu, Nízkých a Vysokých Tater,
Beskyd, Krkonoš, Šumavy.

Bryoporus rugipennis Pand. - Bohemia m.: Jihlávka, 29.4.1978 2 ex. na
podmáčeném Alnetu (Karas lgt.); Dráhov, 13.2.1977 3 ex. v kupkách
mravence Formica sp. (Karas lgt.); Veselí n.Lužnicí, 8.9.1978 2 ex.
v tlejícím pařezu Betula. (Karas lgt.). Druh je rozšířen v severní
a střední Evropě, na Balkáně, Sibiři a Mongolsku. Zatím byl znám jen
z horských poloh. U nás z Vysokých a Nízkých Tater (poslední údaje
Smetana, 1965). Z Čech z Orlických hor.

Tachinus bipustulatus F. - Bohemia b.: Adršpach, 20.10.1977 1 ex. (Macek
lgt.). Rozšířen v Evropě, Sibiři a Japonsku. Z našeho území málo
údajů.

Tachinus rufipennis Gyll. - Bohemia b.: Č.Středohoří-Babiny pr.Litoměř-
ce, 10.5.1976 1 ex. (Čáp lgt.). Rozšíření je poměrně špatně známo,
protože druh žije u drobných savců, kde probíhá i vývoj. Střední Ev-
ropa (s.l.). Brzy na jaře při tání sněhu opouští imago podzemní
hnízdá savců a tehdy se dají sbírat v okolí sněžných polí a pod. U
nás znám jen z hor (V. Tatry, v Čechách Krkonoše).

Encephalus complicans Westw. - Bohemia or.: Týniště n.O., 18.6.1967 1 ex.
Z našeho území málo faunistických údajů, hlavně z Čech. Poslední
údaje Karas (1965) a Boháč (1979 b).

- Leptusa alpicola Brancz. - Slovakia occ.: M.Fatra-Chleb, 1600 m 1 ex. (Strejček lgt.); Slovakia b.: Belanské Tatry-Skalné Vrata, 14.9.1969 1 ex. (Strejček lgt.). Druh je rozšířen od západních Beskyd v Československu přes celý karpatský oblouk až do Transylvánských Karpat v Rumunsku. Ze Slovenska je znám z Vysokých Tater, V.Fatry, Nízkých Tater, Trenčína, Čerchovského poh.Humikol subalpinní a alpinní zóny.
- Leptusa sudetica Lokay - Bohemia b.: Krkonoše-Kotelné jámy, 20.8.1979 1 ex. v prosevu v ledovcovém karu nad horní hranicí lesa (Boháč a Strejček lgt.). Druh je rozšířen od Krkonoš, Hrubého Jeseníku a západních Karpat na Slovensku až na Podkarpatskou Rus.
- Leptusa koronensis Ganglb. - Slovakia or.: N.Sedlica, 5.1975 25 ex. v prosevu ve Fagetu (Rabia skala) (Boháč, Bílek, Werner lgt.), dtto, 5.1975 (Kačenka lgt.). Smetana (1973) ohlásil tento druh jako nový pro naši faunu. Zde západní hranice rozšíření druhu.
- Leptusa brancsiki Smetana - Bohemia m.: Šumava-H.Kvilda, 5.4.1960 2 ex. (Heyrovský lgt.). Druh lesního pásma, rozšířený od Šumavy přes Sude ty do Beskyd a Karpat a odtud až na Podkarpatskou Rus. Munikol.
- Tachysida gracilis Er. - Bohemia m.: Veselí n.L., 12.6.1977 3 ex. v bohatém podkorním humusu borového pařezu (Karas lgt.). Pralesní relik, známý z Vihorlatu, okolí Zvolena a Ruské Poruby. Mapa rozšíř. obr.2.
- Phymatura brevicollis Kr. - Slovakia or.: Remetské Hámre, 5.1975 3 ex. na stromových houbách (Bílek, Boháč, Werner lgt.). Druh je rozšířen v severní části palearktické oblasti. Z našeho území naposledy hlášen Likovským (1967) z Krkonoš a ze Šumavy, ze Slovenska Roubalem (1930).
- Borboropora kraatzii Fuss - Bohemia c.: Solenice (Orlík), 1.-12.8.1970 1 ex. (M.Dvořák lgt.), Moravia m.: Pouzdřany 1 ex. (Fleischer lgt.). Rozšířen v západní, jižní a střední Evropě a na Kavkaze. Druh měl zřejmě v teplejším postglaciálním období širší rozšíření, o čemž svědčí nálezy z ostrovů (Korsika, Anglie, Gotland). Druh žije na mumifikovaných zdechlinách a polovyschlých exkrementech (zejména holubí trus). Teplá místa, suché stráně. Druh žije zřejmě pod zemí (pod zdechlinami), imaga pravděpodobně aktivní večer nebo v noci.
- Falagria concinna Er. - Bohemia b.occ.: Č.Středohoří-Stadice, 25.10.1977 1 ex. (Honců lgt.); Měrunice pr.Teplice, 17.8.1978 1 ex. (Jelínek, Ježek, Kovář lgt., coll.NMP); Bohemia m.: Veselí n.L. 5.1978 1 ex. v letu na zahradě (Máca lgt.). Kosmopolitní druh známý z palearktické, nearktické, neotropické a orientální oblasti. Ze střední Evropy udá-

vá Scheerpeltz (1959). Z Československa hlášen jako nový Boháčem (1979).

Tachyusa nitella Fauv. - Slovakia or.: Čierna n.T., 6.1964 1 ex. (Gottwald lgt.). Druh je rozšířen v jižní Evropě a v jižní části Evropy střední, Malé Asii. Z našeho území je tento druh znám zatím jen ze Slovenska.

Gnypeta velata Er. - Bohemia c.: Praha-Tiché údolí, 1964 1 ex. (Rous lgt.); Praha, 7.1953 1 ex. (Rous lgt.); Bohemia m.: Veselí n.L., 2.9.1962 2 ex. (Karas lgt.); Vlkov n.Luž., 17.5.1975 1 ex. (Karas lgt.); Frahelž, 3.8.1974 1 ex. (Karas lgt.); Chotýčany, 6.6.1961 1 ex. (Karas lgt.); Vrábče 12.7.1971 1 ex. (Karas lgt.); Bohemia b.: Krkonoše-Špindlerův mlýn 11.6.1970 1 ex. (Karas lgt.); Slovakia m.: Malacky, 1965 1 ex. (Rous lgt.); Štúrovo, 1968 1 ex. (Rous lgt.). Druh je rozšířen v severní a střední Evropě, několik údajů z jižní Evropy. Na našem území vzácně a sporadicky. Z Čech uvádí Smetana (1966), z Moravy staré údaje Fleischera (1927) a Wanky (1915), ze Slovenska jeden údaj (Roubal, 1930).

Sipalia chyzeri Epp. - Slovakia occ.: Velká Fatra-Belanská dolina, 12.6.1976 1 ex. v prosevu ve Fagetu (Strejček lgt.). Druh je rozšířen na Slovensku a v severním Maďarsku. Podle Roubala (1930) je to na Slovensku široce rozšířený a v předhůří v hlubokých vrstvách listí hojný druh. V poslední době však už nebyl ze Slovenska hlášen. Roubal (1927) udává nápadný úbytek příbuzného druhu Sipalia kocsi Bernh. vlivem působení člověka.

Atemeles pubicollis Bris. - Slovakia m.: Štúrovo, 14.7.1961 1 ex. (Strejček lgt.). Středoevropský druh (s.l.), který zasahuje až do jižní části severní Evropy. Ze Slovenska udává Roubal (1930) a Smetana (1966).

Calodera nigrita Mannh. - Bohemia c.: Voseček u Poděbrad, 3.6.1925 1 ex. (Rambousek lgt., coll.NMP); Čelákovice 1 ex. (Rambousek lgt., coll.NMP); Bohemia m.: Toušeň 1 ex. (Rambousek lgt., coll.NMP); Moravia b.: M.Ostrava 1 ex. (coll.NMP); Moravia m.: N.Mlýny, 7.1977 v náplavu 2 ex. (Hladil lgt.). Druh je rozšířen v severní části palearktické oblasti. Z našeho území jen několik faunistických údajů.

Calodera protensa Mannh. - Bohemia c.: Voseček u Poděbrad, 3.6.1925 1 ex. (Rambousek lgt., coll.NMP); Praha-Cibulka, 22.10. 1 ex. (Rambousek lgt., coll.NMP); Č.Brod-Zámky, 1 ex. (Rambousek lgt., coll.NMP); Čes. Brod-Rodviňák, 4.1914 1 ex. (Rambousek lgt., coll.NMP); Čelákovice,

15.4.1917 2 ex. (coll.NMP). Střední Evropa a jižní část severní Evropy, Japonsko. Z našeho území jen staré údaje Fleischera (1927) a Horvatha (1872).

Calodera uliginosa Er. - Bohemia c.: Čelákovice, 15.4.1917 1 ex. (Rambousek lgt., coll.NMP); Moravia m.: N.Mlýny, 7.1977 v náplavu 2 ex. (Hladil lgt.); dtto, 16.4.1971 1 ex. na břehu Dyje (Volák lgt.). Druh je rozšířen v severní části palearktické oblasti. Na našem území vzácně a sporadicky, málo údajů. Z Čech uvádí Smetana (1954), Roubal (1941), Likovský (1968), z Moravy a Slovenska staré údaje Fleischera (1927) a Roubala (1930).

Calodera riparia Er. - Bohemia m.: Frahelž, 13.4.1966 1 ex. (Karas lgt.); Klec, 24.4.1966 1 ex. (Karas lgt.); Kolence, 14.5.1966 1 ex. (Karas lgt.); Lužnice, 13.6.1966 1 ex. (Karas lgt.); Bohemia or.: Hradecko, 1 ex. (Kracík lgt., coll.NMP). Palearktický druh. U nás na celém území, ale velmi málo údajů.

Calodera rufescens Kr. - Bohemia or.: Hradec Králové 1 ex. (Kracík lgt., coll.NMP). Střední Evropa (s.l.), místy v severní Evropě. Z našeho území pouze 1 starý údaj ze Slovenska (Roubal, 1930). Nový pro Čechy.

Ocalea concolor Kissw. - Bohemia occ.: Karlovy Vary 1 ex. v náplavu Tepelé (coll.NMP); Bohemia: Bečov 1 ex. (Smolka lgt., coll.NMP). Montánní druh střední Evropy. Fleischer (1927) neudává z Čech konkrétní údaje, Smetana (1954) jeden.

Alaobia scapularis (Sahlb.) - Bohemia m.: Hamr n.Než., 4.7.1965 1 ex. (Karas lgt.); Frahelž, 27.5.1976 1 ex. (Karas lgt.); Veselí n.Luž. 14.8.1960 1 ex. (Karas lgt.); Vrábče, 26.5.1974 2 ex. (Karas lgt.). Z našeho území málo faunistických údajů.

Ousipalia caesula (Er.) - Praha-Tiché údolí, 6.4.1975 15 ex. v prosevu u potoka (Adámek lgt.).

Atheta thinobioides (Kr.) - Bohemia m.: Chotýčany, 15.9.1974 4 ex. (Karas lgt.). Z našeho území málo údajů.

Atheta debilis (Er.) - Bohemia m.: Veselí n.Luž., 12.12.1974 1 ex. (Karas lgt.). Druh je znám z celého našeho území, ale málo údajů.

Atheta gyllenhali (Thoms.) - Bohemia m.: Třeboň, 8.8.1974 3 ex. na mokré louce v zátopové oblasti rybníku Rožmberk (Karas lgt.); Chlum u Třeboně, 22.5.1976 3 ex. (Karas lgt.). Z našeho území je druh znám jen z Čech a Slovenska.

Atheta hygrotopora (Kr.) - Bohemia c.: Praha-Modřanská rokle, 25.7.1978 10 ex. vyplachováním břehu potoka (Strejček lgt.) společně s Atheta insecta (Thoms.), Atheta sulcifrons (Steph.), Atheta luridipennis (Mannh.), Atheta elongatula (Grav.), Tachyusa umbratica Er. a Trogophloeus rivularis Motsch.; Bohemia b.: Krkonoše-Špindlerův Mlýn, 14.6.1970 1 ex. (Karas lgt.); Bohemia m.: Šumava, 8.1964 1 ex. (Rous lgt.); Slovakia occ.: Modrá, 7.7.1967 1 ex. (Karas lgt.); Slovakia m.: Muráň, 7.1978 1 ex.; Slovakia or.: N.Sedlica, 8.1963 2 ex. (Rous lgt.). Druh je znám z celého našeho území, ale málo údajů.

Atheta nannion Joy - Moravia m.: Lednice, 5.1961 1 ex. (Volák lgt.).

Druh byl zatím znám jen z Čech. Nový pro Moravu.

Atheta terminalis (Grav.) - Bohemia c.: Čelákovice, 24.3.1970 2 ex. v prosevu u tůně. Druh znám z celého našeho území, ale málo údajů.

Atheta melanocera (Thoms.) - Bohemia m.: Frahelž, 2.8.1974 1 ex. (Karas lgt.).

Atheta malleus Joy - Bohemia b.: Chabařovice pr.Ústí n.L., 19.8.1967 1 ex. v prosevu u tůně.

Atheta fimorum (Bris) - Moravia m.: Lednice, 5.6.1977 1 ex. (Honců lgt. el coll.). Druh znám zatím jen ze Slovenska. Nový pro Moravu.

Ocyusida rufescens Kr. - Bohemia c.: Týn nad Vlt., 31.7.1912 1 ex. (coll. NMP); Moravia b.: Hr.Jeseník-Praděd, 11.6.1920 1 ex. (coll.NMP). Druh je rozšířen ve střední Evropě (s.l.), v jižních částech jen montánní a subalpinní. Z Čech a Slovenska uvádí Fleischer (1927) bez bližších údajů, ze Slovenska Roubal (1930). Velmi vzácný.

Aleochara lata Grav. - Bohemia c.: Račice u Roudnice, 6.5.1976 1 ex. (Kovář lgt., coll.NMP).

Aleochara peeziiana Lohse - Bohemia c.: Doubravčice, 7.1972 1 ex. (Hromádka lgt.).

Aleochara lygaea Kr. - Bohemia c.: Vrané n.Vlt., 4.1967 1 ex. (Hromádka lgt.).

Aleochara verna Say - Bohemia b.: Č. Středohoří-Raná, 26.7.1975 2 ex. (Honců lgt.).

S o u h r n

V práci jsou uvedeny nálezy 102 druhů vzácných nebo málo známých drabčíků z Československa. Philorinum sordidum Steph. je nový rod a druh pro naše území. Lathrobium crassipes Muls. Rey, Ocypus compressus Nordm. a Calodera rufescens (Kr.) jsou poprvé hlášeny z Čech. Atheta fimorum (Bris.) a Atheta nannion Joy jsou poprvé hlášeny z Moravy. V práci je vyhodnocen výskyt 5 druhů drabčíků, jejichž rozšíření bylo dosud na našem území málo známo (Paederus balcanicus Koch, Rugilus mixtus Lohse, Ocypus biharicus (J.Müll.), Ocypus winkleri Bernh. a Quedius balticus Korge). U těchto druhů jsou přiloženy mapky rozšíření. V práci jsou uvedeny nové nálezy řady druhů s přesnými bionomickými údaji (Omalium rugatum Rey, Rugilus mixtus Lohse, Megalinus glabratus (Muls. Rey), Ocypus winkleri Bernh., Quedius balticus Korge, Bryoporus rugipennis (Pand.)). U několika druhů je poprvé uvedeno více konkrétních údajů z našeho území (Gnypeta velata Er., rod Calodera Mannh., Atheta hygrotopora (Kr.)).

S u m m a r y

New finds of 102 rare or little known Staphylinid species are reported from Czechoslovakia in the present paper. Philorinum sordidum Steph. is a new genus and species for Czechoslovakia. Lathrobium crassipes Muls. Rey, Ocypus compressus Nordm. and Calodera rufescens (Kr.) are reported for Bohemia for the first time. Atheta fimorum (Bris.) and Atheta nannion Joy are reported from Moravia for the first time. The distribution of five species is evaluated in the paper (Paederus balcanicus Koch, Rugilus Mixtus Lohse, Ocypus biharicus (J. Müll.), Ocypus winkleri Bernh. and Quedius balticus Korge), their distribution in Czechoslovakia was little known. Maps of the distribution of these species are attached. New finds of some species with exact data on bionomy from Czechoslovakia are included in the paper (Omalium rugatum Rey, Rugilus mixtus Lohse, Megalinus glabratus (Muls. Rey), Ocypus winkleri Bernh., Quedius balticus Korge, Bryoporus rugipennis (Pand.), Gnypeta velata Er., genus Calodera Mannh., Atheta hygrotopora (Kr.)).

L i t e r a t u r a

- Boháč J., 1972: Příspěvek k faunistice drabčíkovitých Československa (Col., Staphylinidae). Zprávy Čsl. spol. entomol. ČSAV, 8: 25-29.
1979: Faunistic records from Czechoslovakia. Acta entomologica bohemoslovaca, 67: 143
1979 a: Faunistic records from Czechoslovakia. Acta entomologica bohemoslov.

- 1979 b: Nové a zajímavé nálezy drabčíkovitých z Československa (Coleoptera, Staphylinidae). Zprávy Čs.spol.entomol. ČSAV, 15: 121-132.
- Coiffait, 1979: Les Staphylinidae de la région paléarctique occidentale, Tome 3. Supplément a la Nouvelle Revue d'Entomologie, 8, 4, 364 pp. Toulouse.
- Dvořák M., 1962: Drabčici rodu *Ocypus* Leach, podrodu *Alapsodus* Tottenh. v ČSSR (Coll. Staphylinidae). Acta musei silesiae, ser. A, 11: 105-111.
- 1965: Zajímavé nálezy drabčíků na Slovensku (Col., Staphylinidae). Ac.rer.natur. mus.nat.slov., 11: 889-892.
- 1967: Zajímavé nálezy drabčíků na Slovensku II (Col., Staphylinidae). Ac.rer. natur.mus.nat.slov., 13, 1: 81-88.
- Fleischer A., 1927-1930: Přehled brouků fauny Československé republiky. Brno, 4, 485 pp. Zvláštní otisk z Časopisu Moravského zemského muzea, roč. 25-29.
- Gottwald J., 1965: Příspěvek k faunistice Coleopter Slovenského a Muránského krasu a širokého okolí Lápt.Hrádku. Zprávy Čs.spol.entomol.při ČSAV, 1, 2: 1-5.
- Havelka J., 1964: Příspěvek k poznání Coleopter Slovenska. 1.část (Doplňky k Roubalovu Katalogu Coleopter). Ac.rer.natur.mus.nat.slov., 10: 88-97
- Horion A., 1963: Faunistik der Mitteleuropäischen Käfer, 9, Staphylinidae 1.Teil (Micropeplinae bis Euaesthetinae). Überlingen-Bodensee.
- 1965: Faunistik der Mitteleuropäischen Käfer 10, Staphylinidae 2.Teil (Paederinae bis Staphylininae). Überlingen-Bodensee.
- 1967: Faunistik der mitteleuropäischen Käfer, 11, Staphylinidae 3.Teil (Habrocerinae bis Aleocharinae). Überlingen-Bodensee.
- Horváth G., 1872: A tornai hegység Téhelyropu faunája. A magy.orvos.és természetvizsgálók, 15: 1-219.
- Janák J., 1978: Faunistic records from Czechoslovakia. Acta entomologica bohemoslovaca, 75: 421.
- Karas V., 1965: Příspěvek k výskytu vzácných Coleopter. Zprávy Čs.spol.entomol.ČSAV, 1, 5-6: 17-18.
- Likovský Z., 1967: Příspěvek k faunistice československých Aleocharinů (Coleoptera, Staphylinidae). Ad.rer.natur.mus.nat.slov., 13, 1: 89-96.
- 1968: Pozoruhodné nálezy Aleocharinů ze sbírek krajského muzea v Hradci Králové (Coleoptera, Staphylinidae) 1. Acta musei reginaehradecensis, 9: 81-91.
- Lobl I., 1960: Zajímavé nálezy brouků v Československu. Acta musei silesiae, 9: 57-59.
- Nohel P., 1971: Příspěvek k faunistice drabčíků Československého Slezska (Coleoptera, Staphylinidae). Ac.rer.natur.mus.nat.slov., 17, 2: 53-75.
- Roubal J., 1927: O ubývání nebo vymizení některých brouků v ČSR. Čas. Čsl. Sp. Ent., 24: 57-61.
- 1930: Katalog Coleopter Slovenská a Podkarpatska I., Praha.
- 1933: Noví brouci české fauny. Časopis Čs. Spol. Ent., 30: 32.

- 1941: Různé poznámky o některých Lathrobiích (Col., Staph.). Časopis Čs. Spol. Ent., 38: 98-99.
- 1941 a: Příspěvek k poznání zvířeny Častolovické obory u Týniště n.O. Zvláštní otisk čs. Krása našeho domova, 33: 1 - 4.
- 1945: Další příspěvek k seznamu českých Coleopter. Čas.Čs.Spol.Ent., 42: 58-59.
- Scheerpeltz O., 1959: Bestimmungstabelle der paläarktischen Arten der Gattung Falagria Mannh. (Col., Staph.). Kol.Rdsch., 36: 35-47.
- Smetana A., 1954: Systematické a faunistické poznámky ke zvířeně drabčků Československa. Acta soc.entomol.čechosloveniae, 51: 135-148.
- 1957: Systematické a faunistické poznámky ke zvířeně drabčků Československa 3. Acta soc.entomol.čechosloveniae, 54: 146-262.
- 1958: Drabčíkovití-Staphylinidae. 1. část: Staphylininae. Fauna ČSR. 12. NČSAV Praha, 435 pp.
- 1964: Systematische und faunistische Beiträge zur Kenntnis der Staphyliniden-Fauna der Tschechoslowakei 6. Acta Soc.ent.čechoslov., 61: 162-172.
- 1964 a: Die Staphylinidenfauna des Moores Hájek (Soos) in Westböhmen (Col., Staphylinidae). Acta faun.ent.Mus.nat.Praha, 10: 41-124.
- 1965: Zur Kenntnis der Koleoptera mit boreoalpiner Verbreitung in den tschechoslovakischen Karpathen. Proc. 12 th intern. Con. entom. London, 1965: 448-449.
- 1966: Systematische und faunistische Beiträge zur Kenntnis der Staphylinidenfauna der Tschechoslowakei 7. Acta entomol. bohemoslovaca, 63, 4: 322-340.
- 1973: Die Leptusa-Arten der Tschechoslovakischen Republik einschliesslich Karpatorusslands (Col., Staphylinidae). Stuttgarter Beiträge zur Naturkunde, 255: 1-46.
- Strejček J., 1973: Nové nebo jinak zajímavé druhy brouků v Čech a Moravy. Zprávy Čsl. spol.entomol. ČSAV, 9: 57-67.
- Tóth L., 1979: ústní sdělení.
- Uhlig M., 1977: Beiträge zur faunistik der Staphylinidae (Coleoptera). 1. Seltene Steninae, Paederinae, Xantholininae und Staphylininae. Entomologische Nachrichten, 21, 8: 113-118.
- Wanka T., 1915: Beiträge zur Kolepterenfauna von Österreichisch-Schlesiens (Mähren). 1. Beitr. Wien. E.Z., 34: 199-214.

Adresa autora (Author's address):
 Jaroslav Boháč, W. Písecká 90, 101 00 Praha 10.

Obr. 1. Rozšíření některých drabčků v Československu:

■ - *Paederus balcanicus* Koch., ■ - *Ocypus biharicus* (J.Müll.), ▲ - *Ocypus winkleri* Bernh., ● - *Quedius balticus* Korge. (nevybarvené nálezy do r.1920, napůl černě nálezy v letech 1920-1945, černě nálezy v letech 1945-1979).

Obr. 2. Rozšíření některých drabčků v Československu:

● - *Omalium rugatum* Rey, ▲ - *Rugilus mixtus* Lohse, ■ - *Lathrobium crassipes* Muls. Rey- ■ - *Ocypus pedator* Grav., ▼ - *Tachysida gracilis* Er. (nevybarvené nálezy do r. 1920, napůl černě nálezy v letech 1920-1945, černě nálezy v let.1945-1979)

Mapy jsou přiloženy jako samostatná příloha Zpráv Čs. společnosti entomologické při ČSAV, ročník 18, 1982.

O P R A V A

Ve výtahu informace o nových nálezech z časopisu *Acta entomologica bohemoslovaca* FAUNISTIC RECORDS uveřejněném ve Zprávách Čs.společnosti entomologické v ročníku 1980 došlo k opsání chybného údaje u informace Ivana Táborského o druhu *Hydroporus longicornis* SHARP. na straně 137 má být správně lokalita Bohemia bor.: Tisá, 1976; 1977.

