

h a s a r V., 1954: Fauna ČSR, Sv.3, Chrysidoidea: 80. B e r -
l a n d L. & B e r n a r d F., 1938: Faune de France, sv.34,
Hyménoptères vespiformes III: 38. B u y s s o n E. du, 1891:
Species des Hyménoptères d'Europe et d'Algérie. Sv.VI: 148.
G r a n d i G., 1959: Boll.Inst.Entom.Univ.Bologna, 23: 285.
T r a u t m a n n W., 1927: Die Goldwespen Europas: 40.

CHAMAESPHECIA COLPIFORMIS (STAUDINGER) (LEP., SESIIDAE)
V ČESKOSLOVENSKU.

V Prodrumu lepidopter Slovenska je uveřejněn můj první československý nález této nesytky z Kamenice nad Hronom. Nyní ještě sděluji několik bližších údajů. V literatuře se uvádí toto rozšíření: jižní Francie, Rakousko (okolí Vídně), jižní Maďarsko, jediný údaj z Rumunska a Balkán. Živná rostlina a ekologie není známa. Dne 2.července 1963 jsem v okolí Kamenice nad Hronom našel spážené nesytky, které velice upoutaly mou pozornost. Druhý, čtvrtý a šestý kroužek zadečku byly totiž vzadu čistě bíle lemované, tykadla samečka černá, naspodu žlutohnědá, u samičky černá, vespod hnědá; tyto znaky stačí k přesné determinaci druhu Ch.colpiformis (Stgr.), neboť se nevyskytují u žádné další naší nesytky. Blízko uvedené dvojice jsem později našel ještě další čerstvě vylíhlou samičku a v těsné blízkosti prázdnou exuvii kukly, vysunutou z kořene *Salvia pratensis* L. V příštím roce jsem vychoval z této rostliny tři exempláře tohoto druhu. Starší požerok jsem našel na *Salvia austriaca* Jacq., který s největší pravděpodobností patří témuž druhu nesytky. Nemí vyloučeno, že na vhodných stanovištích se najde i v jiných druzích šalvěje.

Ch.colpiformis (Stgr.) je další nesytkou, u níž se nám podařilo zjistiti dosud neznámou živnou rostlinu. Housenka a kukla se podobá ostatním příslušníkům rodu Chamaesphecia a v dalším zpracování se ještě vrátím k jejich podrobnému popisu. Vývoj je jednoletý, způsob života, přezimování a kuklení v rostlině jsou obdobné jako u ostatních druhů této skupiny. Další exempláře motýla jsem chytil v roce 1963 a 1964 na květech žebříčku, rmenu a chebdi, na jiných květech již méně. Létá jednotlivě od konce června až do začátku srpna. Slovenské naleziště je nejsevernějším místem rozšíření tohoto druhu v Evropě.

**CHAMASPHECIA COLPIFORMIS (STAUDINGER) (LEP., SESIIDAE)
IN DER TSCHECHOSLOWAKEI.**

Diese Art habe ich zum erstenmal in der Tschechoslowakei gefangen (Kamenica nad Hronom, Slowakei). Die Raupe dieser Art lebt einjährig in der Salbei (*Salvia pratensis* L., wahrscheinlich auch *S. austriaca* Jacq.). Die Ökologie von *Ch.colpiformis* (Stgr.) ist ähnlich wie bei der verwandten Arten dieser Gruppe.

LITERATURA

H r u b ý K., 1964: *Prodromus Lepidoptera Slovenska*, Praha.
S c h w a r z R., 1953: *Motýli 3*, Praha. S p u l e r A.,
1910: *Die Schmetterlinge Europas II.* Band, Stuttgart.

Jaroslav Wichra.

**RHIZOTROGUS MACULICOLLIS VILLA (COLEOPTERA - SCARABAEOLIDEA)
NOVÝ DRUH PRO ČSSR.**

Rhizotrogus maculicollis Villa je teplomilný druh mediteránního původu. Je rozšířen ve Francii a Itálii (Balthasar 1956), odtud proniká do alpských údolí, a přes Alsasko proniká vzácně až do Bavorska (Reitter 1909). Jelikož jde o druh vysloveně teplomilný a suchomilný, dal se jeho výskyt u nás na příhodných stanovištích jižní Moravy a jižního Slovenska předpokládat. Balthasar (1956) předpokládá také jeho výskyt v nejzápadnější části našeho státu. V roce 1962 jsem zjistil výskyt R.maculicollis na stepní lokalitě na jižní Moravě. Dne 10.června jsem chytil 2 exempláře tohoto druhu v dopoledních hodinách za plného slunečního svitu na stepní floře, tvořené porostem řebříčku sličného (*Achillea nobilis*), kavylu vláskovitého (*Stipa capillata*) a dalšími stepními druhy. Tato lokalita je na okraji státní přírodní rezervace "Pouzďanská step"; tvoří ji suchý k jihu obrácený svah, vybíhající až do vinic v údolí. Okraj lokality je porostlý nízkým řídkým dubovým lesem a skátem. Oba exempláře jsou samičího pohlaví.

Rhizotrogus maculicollis Villa patří do čeledě Melolonthidae, kam náleží celá řada škůdců polního, zahradního a lesního hospodářství a bude proto nutné dalšímu výskytu tohoto druhu,