CHAMASPHECIA COLPIFORMIS (STAUDINGER) (LEP., SESIIDAE) IN DER TSCHECHOSLOWAKEI.

Diese Art habe ich zum erstenmal in der Tschechoslowakei gefangen (Kamenica nad Hronom, Slowakei). Die Raupe dieser Art lebt einjährig in der Salbei (Salvia pratensis L., wahrscheinlich auch S. austriaca Jacq.). Die Ekologie von Ch.colpiformis (Stgr.) ist ähnlich wie bei der verwandten Arten dieser Gruppe.

LITERATURA

H r u b ý K., 1964: Prodromus Lepidopter Slovenska, Praha. S c h w a r z R., 1953: Motýli 3, Praha. S p u l e r A., 1910: Die Schmetterlinge Europas II.Band, Stuttgart.

Jaroslav Wichra.

RHIZOTROGUS MACULICOLLIS VILLA (COLEOPTERA - SCARABAEOIDEA) NOVÝ DRUH PRO ČSSR.

Rhizotrogus maculicollis Villa je teplomilný druh mediterránního původu. Je rozšířen ve Francii a Italii (Balthasar 1956), odtud proniká do alpských údolí, a přes Alsasko proniká vzácně až do Bavorska (Reitter 1909). Jelikož jde o druh vysloveně teplomilný a suchomilný, dal se jeho výskyt u nás na příhodných stanovištích jižní Moravy a jižního Slovenska předpokládat. Balthasar (1956) předpokládá také jeho výskyt v nejzápadnější části našeho státu. V roce 1962 jsem zjistil výskyt R.maculicollis na stepní lokalitě na jižní Moravě. Dne 10.června jsem chytil 2 exempláře tohoto druhu v dopoledních hodinách za plného slunečního svitu na stepní floře, tvořené porostem řebříčku sličného (Achillea nobilis), kavylu vláskovitého (Stipa capillata) a dalšími stepními druhy. Tato lokalita je na okraji státní přírodní reservace "Pouzdřanská step"; tvoří ji suchý k jihu obrácený svah, vybíhající až do vinic v údolí. Okraj lokality je porostlý nízkým řídkým dubovým lesem a akátem. Oba exempláře jsou samičího pohlaví.

Rhizotrogus maculicollis Villa patří do čeledě Melolonthidae, kam náleží celá řada škůdců polního, zahradního a lesního hospodářství a bude proto nutné dalšímu výskytu tohoto druhu,

případně jeho bionomii, věnovat pozornost. Nález R.maculicollis Villa na Moravě představuje důležitý poznatek pro zoogeografický výzkum našeho území, zejména pro poznání rozšíření jižních mediteráních druhů ; je současně nejvýchodnějším místem výskytu tohoto druhu v Evropě.

RHIZOTROGUS MACULICOLLIS VILLA, EINE NEUE KÄFERART AUS DER TSCHECHOSLOWAKEI.

Diese Westmediterrane Art ist in Frankreich und Italien verbreitet und von hier ist sie in die südlichen Alpentäler eingedrungen. Über Elsass ist sie bis nach Bayern verbreitet, wo sie aber sehr selten ist. Auf dem Gebiete unseres Staates wurde sie bis jetzt nicht festgestellt. Balthasar (1956) setzt voraus, dass sie im westlichsten Teile unseres Staates vorkommen könnte. Anfang Juli 1962 fang ich in Pouzdřany zwei Stück dieser Art an einer warmen Stepenlokalität in den Vormittagsstunden. Das Vorkommen dieser Art in Süd-Mähren ist sicher sehr interessant und überraschend.

LITERATURA

B a l t h a s a r V., 1956: Fauna ČSR, Listorozí I., Praha. H o r i o n A., 1935: Nachtrag zu Fauna Germanica, Krefeld. R e i t t e r E., 1909: Fauna Germanica II., Stuttgart.

Jiří Čech.

K VÝSKYTU PONERA PUNCTATISSIMA ROGER V ČECHÁCH (HYMENOPTERA,FORMICOIDEA).

Tento mravenec žije vzácně na různých místech střední Evropy. Kolonie jsou často ve zdech, pekárnách, sklenících, stájích a podobných stanovištích. Z našeho území jsou dosud známy dva nálezy z Moravy, a to z Hádů u Brna (Soudek) a hadcové stepi u Mohelna (Kratochvíl). Z Čech je uváděn od Velkého Vřešťova (Samšiňák). Na všech těchto lokalitách byly sbírány pouze jednotlivé exempláře, především okřídlené samičky.

Poměrně hojný výskyt tohoto druhu jsem zjistil na několika nových nalezištích: Bohemia or. - Staré Smrkovice, 8.VI., 4.X.,