případně jeho bionomii, věnovat pozornost. Nález R.maculicollis Villa na Moravě představuje důležitý poznatek pro zoogeografický výzkum našeho území, zejména pro poznání rozšíření jižních mediteráních druhů ; je současně nejvýchodnějším místem výskytu tohoto druhu v Evropě.

RHIZOTROGUS MACULICOLLIS VILLA, EINE NEUE KÄFERART AUS DER TSCHECHOSLOWAKEI.

Diese Westmediterrane Art ist in Frankreich und Italien verbreitet und von hier ist sie in die südlichen Alpentäler eingedrungen. Über Elsass ist sie bis nach Bayern verbreitet, wo sie aber sehr selten ist. Auf dem Gebiete unseres Staates wurde sie bis jetzt nicht festgestellt. Balthasar (1956) setzt voraus, dass sie im westlichsten Teile unseres Staates vorkommen könnte. Anfang Juli 1962 fang ich in Pouzdřany zwei Stück dieser Art an einer warmen Stepenlokalität in den Vormittagsstunden. Das Vorkommen dieser Art in Süd-Mähren ist sicher sehr interessant und überraschend.

LITERATURA

B a l t h a s a r V., 1956: Fauna ČSR, Listorozí I., Praha. H o r i o n A., 1935: Nachtrag zu Fauna Germanica, Krefeld. R e i t t e r E., 1909: Fauna Germanica II., Stuttgart.

Jiří Čech.

K VÝSKYTU PONERA PUNCTATISSIMA ROGER V ČECHÁCH (HYMENOPTERA,FORMICOIDEA).

Tento mravenec žije vzácně na různých místech střední Evropy. Kolonie jsou často ve zdech, pekárnách, sklenících, stájích a podobných stanovištích. Z našeho území jsou dosud známy dva nálezy z Moravy, a to z Hádů u Brna (Soudek) a hadcové stepi u Mohelna (Kratochvíl). Z Čech je uváděn od Velkého Vřešťova (Samšiňák). Na všech těchto lokalitách byly sbírány pouze jednotlivé exempláře, především okřídlené samičky.

Poměrně hojný výskyt tohoto druhu jsem zjistil na několika nových nalezištích: Bohemia or. - Staré Smrkovice, 8.VI., 4.X.,

10.XII.1965; Chomutice, 26.V., 23.IX.1965; Lískovice, 13.XII. 1965. Sbírány byly hlavně dělnice, ojediněle i bezkřídlé samičky. Dokladové kusy jsou uloženy v mé sbírce a sbírce Dra Samšiňáka, kterému též děkuji za půjčení literatury.

P.punctatissima žije na těchto lokalitách terrikolně ve starých stájích pro skot. Kolonie byly zjištěny na stinných místech ve tlejících zbytcích podestýlky a krmiv pod žlaby, v trhlinách podlahy apod. Z fauny těchto míst uvádím nejtypičtější druhy brouků a ploštic.

C o l e o p t e r a :

Rugilus orbiculatus Pk., Cordalia obscura Grav., Xylodromus concinnus Marsh. (a řada jiných Staphylinidů), Acrotrichis sp., Ahasverus advena Waltl., Monotoma picipes Hbst., Atomaria sp., Cryptophagus sp., Ephistemus globulus Payk., Lathridius sp.., Cartodere sp.; Typhaea stercorea L., Anthicus quisquilius Th., Alphitophagus bifasciatus Say.

H e t e r o p t e r a :

Lyctocoris campestris F., Xylocoris galactinus Fieb.

P.punctatissima je v našich podmínkách hojnější než se dosud předpokládalo a je zřejmě stálým a typickým obyvatelem stájí a podobných stanovišť i v jiných oblastech naší republiky.

LITERATURA

K r a t o c h v í l J., 1941: Myrmekologické poznámky 5., Čas.Čs.Spol.ent., 1941, Praha. S a m š i ň á k K., 1964: Zur Kenntnis der Ameisenfauna der Tschechoslowakei, Čas.Čs.Spol. ent., 1964, Praha. S o u d e k Š., 1922: Mravenci, Čs.spol. ent., Praha. S t i t z H., 1939: Ameisen oder Formicidae. Tierw.Deutschl.37.

Ladislav Vysloužil.

ZPRÁVY ORGANISAČNÍ

Vede Dr.L.Heyrovský

Pracovní členské schůze

V minulém roce rozhodl výbor Čs.společnosti entomologické, aby byly obnoveny řádné členské schůze s pracovní náplní. Zatím