

PAVOUČNICE CHIONEA ARANEOIDES DALMAN NA MORAVĚ
(DIPTERA LIMONIIDAE)

DIE SCHNEEFIEGE CHIONEA ARANEOIDES DALMAN AUF MÄHREM

František Chládek

Rod Chionea (s.l.) Dalman, 1816 je na území ČSSR zstoupen podle současného stavu znalostí třemi druhy. Jsou to Chionea (Niphadobata) lutescens Lundström, 1907, který je znám z Čech, Moravy a pravděpodobně i Slovenska. Z území Slovenska a Moravy je známa Chionea (Niphadobata) kratochvíli (Burghelle-Balacesco, 1969). Třetím druhem je Chionea araneoides Dalman, 1816. Dosud byl uváděn jen z Čech a Slovenska, často pod synonymy Chionea hraběi Kratochvíl nebo Chionea minuta Tahvonen.

Na Moravě jsem Chionea araneoides zjistil na kopci Sýkoř (702 m n.m.) východně od Nedvědic na Českomoravské vrchovině. V r. 1980 jsem 27. prosince našel v lese na sněhu tři samičky a 29.12.1982 jednoho samečka a jednu samičku v nadmořské výšce asi 600 m n.m. Správnost determinace jsem si ověřil podle srovnávacího materiálu od J. Starého z Olomouce, kterému stejně jako Dr. R. Rozkošnému z Brna děkuji za cenné informace a literaturu o rodu Chionea. Srovnávací materiál byl chycen do zemních pastí v listopadu 1978 v Hrubém Jeseníku (J. Roháček leg. J. Starý det.) a je dalším dokladem o existenci Ch. araneoides na Moravě.

Z u s a m m e n f a s s u n g

Der Verfasser beschreibt die ersten Fundorte der Art Chionea araneoides Dalman in Mähren. Diese Art ist dadurch in allen Ländern der Tschechoslowakei bekannt.

L i t e r a t u r a

Kratochvíl J., 1936: Renseignements sur les especes du genre Chionea Dalm. de Tchecoslovaquie. Bull. de la Societé entomol. de France, 15:243-250.

Starý J., 1981: Nachträge und Berichtigungen zur Limoniiden-Fauna der Tchechoslowakei (Diptera) II. Acta Rer. natur. Mus. nat. slov. Bratislava, 27:99-122.

Adresa autora (Anschrift des Autors):

RNDr. František Chládek, Ulice bratří Čapků 12, 602 00 Brno

Zprávy Čs. společnosti entomologické při ČSAV, Praha, 20, 1984