Summary

There are 111 beetles species of the genus Cerymbycidae in the area of Křivoklát. The new speciesin this area is Nevellia sanquinosa (Gyll.).

Literatura

Heyrovský L., 1955 : Tesaříkovití Cerambycidae , Fauna ČSR 5, ČSAV Praha.

Adresa autora :

Alexandr Burda, Karla Čapka č. 1378, 266 01 Beroun.

IV. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE O JEPICÍCH (EPHEMEROPTERA)

Ve dnech 4.-10.září 1983 se na zámku v Bechyni konala IV. mezinárodní konference o jepicích, které se zúčastnilo přes 50 odborníků z více než 20 zemí. Jednání konference proběhlo v 5 sekcích (historické aspekty výzkumu vodního hmyzu; vyšší klasifikace, fylogeneze, paleontologie; regionální taxonomie, faunistika a biogeografie; morfologie, fyziologie, ultrastruktura a biosystematika; životní cykly, produkce, působení znečištění), ve kterých bylo předneseno 38 referátů. Konferenci organizoval Entomologický ústav ČSAV ve spolupráci se stálým mezinárodním výborem pro pořádání konferencí o vodním hmyzu. Československo bylo požádáno o organizaci této konference vzhledem k bohatým tradicím výzkumu vodního hmyzu a vzhledem k mezinárodnímu významu výsledků výzkumu dosažených v poslední době. Na rozdíl od předchozích konferencí, které se konaly na Floridě, v Polsku a Kanadě, bylo mnohem více referátů zaměřeno na aplikaci moderních biologických metod (např. elektroforeza, elektronová mikroskopie, mnohorozměrná analýza aj.) ve výzkumu vodního hmyzu a v jeho biosystematice a na studium vlivu znečištění vodních biotopů na hmyz. Poslední otázka je velmi významná hlavně proto, že vodní hmyz má, kromě možností bioindikačních, nesmírný význam při uplatňování samočistící schopnosti vod.

Tomáš Soldán.