

PŘÍSPĚVEK K FAUNISTICE BROUKŮ TRIBU CARABINI NA DĚČÍNSKU

(COLEOPTERA CARABIDAE)

Jan Pokorný

Navazuji na článek Leoše Malíka "Střevlíkovití města Děčína" Zprávy Čs.spol.entomol.při ČSAV číslo 2, ročník 1982, který podal přehled druhů drobných střevlíkovitých. Do seznamu jsem zahrnul druhy sebrané na území CHKO Labské pískovce a části CHKO České středohoří v letech 1978 až 1984. CHKO Labské pískovce leží v Děčínské vrchovině. Jde o kvádrové pískovce se snadnou propustností vody do hloubky, na povrchu suché. Oblast se vyznačuje značně členěným reliéfem s různorodými proměnami teplotními, světelnými a vlhkostními. Vznikají tím extrémní podmínky na vrcholech a na dně roklí a různorodý vegetační kryt. Místy prorážejí třetihorní čedičové útvary. Vegetační období 130 - 165 dnů, klima vlhké. Oblast České středohoří přiléhající k Děčínu a táhnoucí se dál až k Benešovu nad Ploučnicí je tvořena třetihorními vyvěřelými kupami čedičů a znělců. Je kryta z velké části smíšeným lesem.

Sběr byl prováděn individuálním odchytom a pomocí zemních pastí. Lgt. et det. J. Pokorný, dokladové exempláře ve sbírce autora.

Cychrus caraboides L., ssp. caraboides L.

n. caraboides L. - Dostí častý v lesích vyšších poloh. Převažují velké exempláře 18 - 21 mm. Děčín-Javory, Studenec, Chlum, Sněžník, České Kamenice, Benešov nad Pločnicí, Růžová, Labská stráň.

Cychrus attenuatus F.

n. attenuatus F. - Vzácně v bukových lesích. Děčín-Přípeř, Děčín-Loubí - 140 m n.m. 4 ex.

Carabus (Eucarabus) arcensis HERBST., ssp. arcensis HERBST.

n. arcensis HERBST., ab. viridis LETZN. - 3 ex. Labská stráň kusy nejsou typické, zřejmě přechod k m. germaniae

m. germaniae LENG. - V lesních průsecích a pasekách na písčitém podkladě. Výhradně nigrofemorální exempláře. Sněžník, Maxičky, Růžová, Labská stráň.

ab. viridiaeneus LETZN. - Maxičky.

Carabus (Carabus) granulatus L., ssp. granulatus L.

n. granulatus L. - Ve vlhkých smíšených lesích nízkých a středních poloh. V pískovcích méně hojný.

ab. virescens LETZN. - Benešov nad Ploučnicí, Žandov.

ab. rufofemoratus LETZN. - Hojně mezi nom. formou, asi polovina exemplářů.

Carabus (Carabus) cancellatus ILL., ssp. cancellatus ILL.

n. cancellatus ILL. - Na polích a okrajích lesů. Děčín-Javory, Studenec, Bohyně, Tisá, Libouchec, Benešov nad Ploučnicí, Růžová, Arnoltice, Velká Bukovina.

n. brevituberculatus ROUB. - Růžová.

Carabus (Carabus) auratus L.

n. auratus L. - Na zahradách, lukách a polích v blízkém okolí Děčína.

n. opacoviridis D'TORRE - Chrochvice.

Carabus (Archicarabus) nemoralis MÜLL.

n. nemoralis MÜLL. - Na zahradách, okrajích lesů a na březích Labe. Děčín-Bohyně, Bynov, Javory, Bělá, Chlum, Sněžník, Česká Kamenice, Benešov nad Ploučnicí.

ab. deletus LAP. - Děčín.

Carabus (Oreocarabus) hortensis L., ssp. hortensis L.

n. hortensis L. - V lesích, nejčastěji smrkových, na děčínsku nejhojnější Carabus. Děčín, Sněžník, Tisá, Růžová, Česká Kamenice, Hřensko, Vysoká Lípa, Krásná Lípa, Chřibská.

Carabus (Oreocarabus) glabratus PAYK.

n. glabratus PAYK. - Ve vysokém bukovém lese. Děčín-Maxičky. - 2 ex. 6. 8. 1982.

Carabus (Orinocarabus) linnei PANZ.

n. linnei PANZ. - Ve smrkových monokulturách vyšších poloh. Mezná, Hřensko, Vysoká Lípa, Růžová.

Carabus (Orinocarabus) silvestris PANZ., ssp. silvestris PANZ.

n. silvestris PANZ. - Tisá 400 m n.m. Na pískovcích ve smrkových lesích. Některé exempláře se světle červenými holeněmi, basálními částmi tykadlových článků a tarsů.

Carabus (Mesocarabus) problematicus HBST., ssp. problematicus HBST.

n. diluvialis BL.NÜSS. - Ve smrkových i smíšených lesích, dosti často společně s *Carabus hortensis*. Růžová, Vysoká Lípa, Česká Kamenice, Kytlice a dále v Lužických horách.

Carabus (Hemicarabus) nitens L.

1 ex. - V.1964, Děčín-Maxičky, lgt. P.Bedl, na vřesovišti uprostřed rozsáhlého lesního komplexu na písčitém podkladě. Aktivní za dne.

Carabus (Tomocarabus) convexus F., ssp. convexus F.

n. convexus F. - V křovištní formaci u polí. Děčín-Chlum 1 ex. Žandov 2 ex.

Carabus (Chaetocarabus) intricatus L., ssp. intricatus L.

n. intricatus L. - Na zahradách, u řek, v lesích na čedičových sutích. Děčín, Hřensko, Růžová, Česká Kamenice, Benešov n.Plouč. m. bohémica HAURY - Benešov nad Ploučnicí.

m. angustula HAURY - Růžová.

1 ex. se silně setřelou skulpturou, velmi ploše klenutý, primární, sekundární i terciární intervaly zcela propletené a zploštělé. Růžová 20. 11. 1980.

Carabus (Platycarabus) irregularis F.

n. irregularis F. - Ve vlhkých bukových lesích nad 500 m n.m. Buková hora, Růžák.

ab. sculptilis HEER. - Růžák 550 m n.m.

Carabus (Megodontus) violaceus L., ssp. violaceus L.

n. violaceus L. - V lesích a na jejich okrajích. Děčín, Arnoltice.

m. psiloptera KR. - Maxičky, Benešov nad Ploučnicí, Kytlice.

m. candidata DUFT. - Růžová, Arnoltice, Labská stráň.

Carabus (Procrustes) coriaceus L., ssp. coriaceus L.

n. coriaceus L. - Na okrajích listnatých lesů. Děčín-Studenec, Letná, Bělá, Škrabky, Chlum, Březiny, Benešov nad Ploučnicí, Všemily.

Carabus (Chrysocarabus) auronitens F., ssp. auronitens F.

n. auronitens F. - Ve vlhkých listnatých i jehličnatých lesích středních a vyšších poloh. Děčín-Loubí 200 m n.m., Tisá, Sněžník, Arnoltice, Býnovec, Růžová, Buková hora, Česká Kamenice, Benešov nad Ploučnicí, Markvartice, Chřibská.

ab. viridis LETZN. - Tisá, Benešov nad Ploučnicí.

S o u h r n

V širším okolí Děčína bylo zjištěno 17 druhů rodu Carabus a dva druhy rodu Cychrus.

Z u s a m m e n f a s s u n g

In der Umgebung von Tetschen (Děčín) sind 17 Carabus und 2 Cychrus Arten festgestellt worden.

L i t e r a t u r a

Niedl J., 1956 - 1958 : Monografie čs. druhů tribu Carabini I. - VI.
Přírodovědecký sborník ostravského kraje.

Adresa autora (Anschrift des Autors) :

Jan Pokorný, Marie Majerové 10, 405 02 Děčín VI.