
TESAŘÍKOVITÍ NA JIŽNÍM OKRAJI PRAHY

Petr Ričl

Svůj průzkum jsem prováděl na jižním okraji Prahy v okolí Zbraslavi na obou březích Vltavy a na stráních a náhorních plošinách na Závisti, na Točné i v okolí Vraného nad Vltavou. Na březích řeky jsou charakteristické pobřežní porosty s převládajícími vrbami, na stráních a úžlabinách převládají smrky, borovice, habr a bříza a na náhorních planinách dubiny.



Pogonocherus decoratus Fairm.

orig. autor

Lokalita Praha 5 - Zbraslav

1.	Rhagium sycophanta (Schrank)	V.-VII.	řídký
2.	Stenocorus quercus (Götz)	VI.	řídký
3.	Stenocorus meridianus (L.)	VI.	běžný
4.	Grammoptera ruficornis (F.)	V.-VI.	řídký
5.	Allosterna tabacicolor (Deg.)	2.VI.1981	1 ex.

6.	Leptura rufipes Schall.	VI.	řídký
7.	Leptura sexguttata F.	VI.	řídký
8.	Leptura rubra L.	VII.-VIII.	hojný
9.	Leptura sanquinolenta L.	VI.	řídký
10.	Strangalia maculata (Poda)	VI.-VII.	hojný
11.	Strangalia melanuta (L.)	VI.-VII.	hojný
12.	Asemum striatum (L.)	V.-VI.	řídký
13.	Tetropium castaneum (L.)	VI.	hojný
14.	Cerambyx scopolii (Füessly)	VI.	řídký
15.	Axinopalpis gracilis (Kryn.)	5.VI.1980	1 ex.
16.	Molorchus minor (L.)	V.-VI.	hojný
17.	Molorchus umbellatárum	V.-VI.	řídký
18.	Aromia moschata (L.)	VII.-IX.	běžný
19.	Callidium violaceum (L.)	V.-VI.	hojný
20.	Callidium aeneum Deg.	V.-VI.	řídký
21.	Pyrrhydium sanquineum (L.)	V.-VI.	hojný
22.	Phymatodes testaceus (L.)	V.-VI.	běžný
23.	Phymatodes alni (L.)	V.-VI.	běžný
24.	Xylotrechus antilope (Sch.)	VI.	řídký
25.	Clytus arietis (L.)	VI.	řídký
26.	Plagionotus arcuatus (L.)	V.-VI.	hojný
27.	Chlorophorus figuratus (Scop.)	VI.	řídký
28.	Anaglyptus mysticus (L.)	V.-VI.	běžný
29.	Lamia textor (L.)	V.-IX.	řídký
30.	Pogonocherus hispidulus (P.)	IV.-VII.	běžný
31.	Pogonocherus hispidus (L.)	IV.-VII.	běžný
32.	Pogonocherus fasciculatus (D.)	23.IV.1982	4 ex.
33.	Pogonocherus decoratus Fair.	23.IV.1982	2 ex.
34.	Acanthocinus aedilis (L.)	IV.-VI.	běžný
35.	Liopus nebulosus (L.)	V.-VI.	běžný
36.	Agapanthia villosoviridescens	VIII.	hojný
37.	Oberea oculata (L.)	VII.-VIII.	řídký

Lokalita Praha 4 - Modřany (Točná)

38.	Acmaeops collaris (L.)	10.VI.1980	1 ex.
39.	Judolia cerambyciformis (Sch.)	VI.-VII.	běžný
40.	Criocephalus rusticus (L.)	28.VII.1984	2 ex.

Lokalita Vrané nad Vltavou (Homole)

41.	Rhagium mordax (Deg.)	V.-IX.	řídký
42.	Rhagium inquisitor (L.)	V.-IX.	hojný
43.	Cortodera femorata (F.)	30.V.1982	2 ex.
44.	Grammoptera variegata (Germ.)	30.V.1982	1 ex.
45.	Strangalia aethiops (Poda)	VI.	řídký
46.	Strangalia revestita (L.)	30.V.1982	1 ex.
47.	Hylotrupes bajulus (L.)	VI.	řídký
48.	Rhopalopus femoratus (L.)	30.V.1982	1 ex.
49.	Pronocera angusta (Kr.)	1.VIII.1980	1 ex.
50.	Saperda carcharias (L.)	3.IX.1984	1 ex.
51.	Stenostola ferrea (Schr.)	V.	řídký
52.	Stenostola dubia (Laich.)	V.	řídký
53.	Phytoecia coerulescens (Sc.)	23.VI.1982	2 ex.

Na této lokalitě byl před léty chytán T.Krásou Acimerus schaefferi (Laich.), Cerambyx cerdo L. a Agapanthia kirbyi (Gyllh.)

Za nejvíce ohrožené druhy této oblasti je možno považovat Aromia moschata (L.), Lamia textor (L.) a Oberea oculata (L.).Stavbou jezu u Modřan dojde ke zvýšení hladiny Vltavy až po Zbraslav a tím se zatopí pobřežní pásmo vrbového porostu. Navíc se začalo v roce 1984 se zavážkou této lokality od mostu na Zbraslavi směrem ku Praze z důvodů zpevnění a zvýšení navigace.

Hodlám pokračovat ve výzkumu této oblasti a proto nepovažuji seznam 53. druhů zatím zjištěných za konečný. Všechny uvedené druhy lgt. et coll. autor.

Adresa autora :

Petr Ričl , Za školou 470, 254 01 Jílové u Prahy