Femur je ve středu opatřen dozadu zahnutými zoubky. Vnější hrana předních tibií je pilovitá a za středem vyrůstá trn směřující šikmo na horu. Hlava a štít jsou silně tečkované. Druh se podobá některým zástupcům Lucanidae.

Podčeleď Eucharinae je stavěna v systematice blízko k Loxosticti a to do příbuzenství k Cetoninae, Dynastinae a Rutelinae.

Dokladový exemplář je ve sbírce autora.

L i t e r a t u r a

Entomologische Zeitschrift, 93, Frankfurt - Michael Lüttgen.

Adresa autora :

Ing. Josef Mašek, Fučíkova 387, 364 52 Žlutice.

Redakční poznámka :

Ve Zprávách Čs.spol. entomologické při ČSAV nejsou obvykle uveřejňovány faunistické příspěvky o fauně jiných států. Vzhledem k závažnosti tohoto nálezu v oblasti, kam zajíždí řada československých entomologů, považujeme za vhodné tento článek uveřejnit.

O P R A V A

Na svazku číslo jedna letošního ročníku je omylem uvedeno číslování 1 - 7. Správné číslování má být pouze 1, další svazky jsou číslovány samostatně, číslo 2, 3, 4, Seznam biografií sedmé pokračování, Klíč k určování hmyzu sv. 5.