LITERATURA

Čejchan A., 1955: Rovnokřídlý hmyz (Orthoptera) státní přírodní rezervace u Č.Krumlova. Čas.Nár.mus.odd.přír., 124: 142-144. Čejchan A., 1959: Příspěvek k poznání rovnokřídlého hmyzu (Orthoptera) a švábů (Blattodea) Rychlebských hor. Rychlebské hory. Sbor.prací o přír.poměrech, Ostrava: 323-327. Dobšík B., 1951: K poznání Orthopter a Dermapter Slezska. Přír.sbor.Ostravského kraje, 12: 102-119. Dobšík B., 1959: Rovnokřídlý hmyz (Orthoptera) Rychlebských hor, 1.část. Rychlebské hory. Sbor.prací o přír.poměrech, Ostrava: 290-297. Ginter O., 1951: Výskyt vzácnějších Orthopter na Moravě. Entom.listy (Folia entom.) 14: 167-169. Obenberger J., 1926: Rovnokřídlý hmyz (Orthoptera a Dermaptera) Republiky československé. Praha. Schneeberg A., 1931: Orthoptera okolí Bratislavy. Sborník přírod. odboru Slov.Vlast.Muzea, 1924-1931: 91-107. Vojtek J., 1949: Příspěvek k poznání slezských Orthopter. Přír. sbor. Ostrav. kraje, 10: 319-337.

DŘEPČÍK CHAETOCNEMA HEIKERTINGERI LUBISCHEV 1963 V ČESKOSLOVENSKU (COLEOPTERA, ALTICIDAE)

Sdělení z pracovní schůze Společnosti dne 19.února 1966.

Jeden z našich nejhojnějších dřepčíků Chaetocnema concinna (Marshall 1802) byl Lubischevem (1963) rozdělen na tři samostatné druhy. Lubischev došel k tomuto výsledku biometrickým měřením některých distancí na jedincích z různých lokalit a jejich matematickým vyhodnocením. Jménem Ch.concinna označuje Lubischev populace, které převládají v západních částech palearktické oblasti, další dva popsal jako nové: Ch.heikertingeri Lubischev, kterou zjistil na různých lokalitách od Dálného východu až po Vogézy, a Ch.heptapotamica Lubischev, která byla zjištěna v jižním Kazachstanu a v Kirgizii. Všechny tři taxony mohl pak také rozlišit podle tvaru aedoeagu. Při sdělení byly demonstrovány oba druhy, které žijí u nás, a schematické obrázky uvedených orgánů. Ch. concinna: strany aedoeagu od polovice délky mírně rozbíhavé a k hrotu ponenáhlu zúžené. Ch. heikertingeri: stra-

ny aedoeagu rovnoběžné a teprve těsně před apexem náhle zúžené. Z 30 zkoumaných samců z různých míst Československa zjistil jsem podle kopulačních orgánů Ch. concinna 22 x , Ch. heikertingeri 8 x, a to z lokalit: (od východu k západu) Slov. or. Turna n.B. 13.7.1946 Král. -- Sil.Besk.Staré Hamry 8.1943 Král. -- Mor.Mikulov 18.9.1960 Strejček. -- Boh.Libčany u Hr.Králové 20.10.1945 2 ex. Smetana. -- Boh.Želivka (Sedlické údolí) 14. 4.1965 Strejček. -- Boh.Heřm.Městec 1935 Kult. -- Boh.Obora u Plzně 1944 Brožík.

Zatím není možné o povaze nálezů u nás říci nic bližšího a bylo by třeba poznamenávat při sbírání těchto druhů přesnější údaje, např. výšku nebo zejména přesné (a kritické) označení živné rostliny. V úvahu přicházejí různé merlíkovité (mladá řepa!) a rdesnovité, např. Polygonum, Rumex.

Pisatel vyzval přítomné, aby věnovali sbírání obou druhů Chaetocnema pozornost a předávali mu nálezy k determinaci, zvláště pokud by byly doplněny podrobnými údaji o naleziští. Tím by taxonomické poznatky mohly být doplněny o bionomické.

DER ERDFLOH CHAETOCNEMA HEIKERTINGERI LUBISCHEV 1963 IN DER TSCHECHOSLOWAKEI (COLEOPTERA, ALTICIDAE)

Auf einer Arbeitssitzung der Entomologischen Gesellschaft am 19.Februar 1966 wurde vom Verfasser die jüngst von Chaetocnema concinna (Marshall 1802) abgetrennte Ch.heikertingeri Lubischev 1963 aus der Tschechoslowakei gemeldet und die Art demonstriert.

LITERATURA

L u b i s c h e v A.A., 1963: Dla novich palearktičeskich vida roda Chaetocnema gruppi Ch. concinna Marsh. (Coleoptera, Chrysomelidae, Halticinae). In: Entomologičeskoje obozrenije, 42: 858-863.

Josef K r á l

DASYPOLIA TEMPLI (THNBG.) (LEP., NOCTUIDAE) NA ŠUMAVĚ

Miloslav Kudla uvádí ve 4. čísle I.roč. "Zpráv" výskyt té-