FAUNA TESAŘÍKOVITÝCH V OKOLÍ BLATNÉ

THE CERAMBYCIDS FAUNA OF THE BLATNÁ SURROUNDINGS

(CERAMBYCIDAE, COLEOPTERA)

Jiří Simandl

Oblast Blatenska, která leží v severozápadním cípu jižních Čech, patří k entomologicky málo atraktivním oblastem v Čechách, a proto faunistické údaje z těchto míst téměř chybí. Méně pestrá entomofauna odpovídá převážně monokulturnímu charakteru smrkových porostů s poměrně intenzívním lesním hsopodářstvím.

Cílem článku je přispět k faunistickému průzkumu hmyzu v ČSSR a z entomologického hlediska k poznání fauny této málo známé části jižních Čech.

Charakteristika území

Okolí Blatné patří do stupně dubu a buku (Plíva, Průša, 1969) s nadmořskou výškou 400 až 550 m. Ve vegetaci převládají lesní porosty s jehličnatými monokulturami. Především je zastoupen smrk a borovice, místy porosty smíšené s dubem, lípou, břízou a dalšími listnáči. Z hlediska hmyzu jsou významné roztroušené listnaté dřeviny, parky, listnaté aleje nebo doprovodné porosty vodních toků apod.

Meteorologická charakteristika za období 1976 - 1980:
Průměrné roční srážky: 567 mm
Průměrná roční teplota: + 6,7 °C
Počet hodin slunečního svitu za rok: 1497 hod.
Počet dnů s teplotou pod 0 °C: 128

Materiál a metodika

Pozorování probíhalo v letech 1975-1981 a sledovaná oblast zahrnuje území o poloměru 12 - 15 km se středem v Blatné. Materiál byl získáván individuálním sběrem, sklepáváním, smýkáním a některé druhy metodou dochování ex larvae. Zjištěné druhy byly rozděleny do několika skupin podle počtu odlovených jedinců a toto velmi hrubé dělení má pouze pro tento účel sloužit k přehlednější orientaci.

Přehled zjištěných druhů

1. hojné druhy, běžné na většině sledované plochy:

Rhagium inquisitor (L.)
Allosterna tabacicolor (Deg.)
Leptura maculicornis Deg.
Leptura rubra L.
Vadonia livida (F.)
Judolia cerambyciformis (Schr.)
Strangalia maculata (Poda)
Strangalia melanura (L.)
Spondylis buprestoides (L.)
Arhopalus rusticus (L.)
Asemum striatum (L.)
Tetropium castaneum (L.)
Molorchus minor (L.)
Callidium violaceum (L.)

2. hojnější druhy, omezené na určitou lokalitu:

Prionus coriarius (L.)
Pachyta quadri-maculata (L.)
Gaurotes virginea m. thalassina Schr.
Strangalia bifasciata (Müll.)
Aromia moschata (L.)
Phymatodes testaceus (L.)
Exocentrus lusitanus (L.)
Agapanthia villosoviridescens (Deg.)
Stenostola dubia (Laich.)

3. řídké druhy, vyskytující se na většině území:

Rhagium bifasciatum F.
Grammoptera ruficornis (F.)
Strangalia nigra (L.)
Tetropium fuscum (F.)
Obrium brunneum (F.)
Hylotrupes bajulus (L.)
Clytus arietis (L.)
Pogonochaerus fasciculatus (Deg.)
Acanthocinus aedelis (L.)
Saperda carcharias (L.)
Saperda populnea (L.)
Saperda scalaris (L.)
Oberea oculata (L.)

4. vzácné druhy, nalezené jen v malém počtu:

Cortodera femorata (F.) - 1 ex. 15.6.1975 na trávě, 1 ex. 24.5.1977 v letu

Grammoptera variegata (Germ.) - 1 ex. 19.5.1981 na listě jívy

Pronocera angusta (Kriechb.) - 1 ♀ 31.7.1981 na smrkových polenech, 1 ex. ex larva 1980

Clytus lama Muls. - 2 ex. 16.7.1979 na smrkových polenech

Chlorophorus herbsti Brahm. - 1 ex. 30.7.1975, 1 ex. 19.7.1978 na staré lípě, 2 ex. ex larvae

Pogonochaerus hispidus (L.) - 2 ex. 3.7.1975 na lipových větvích in copula

Pogonochaerus decoratus Fairm. - 2 ex. 31.8.1979, 3 ex. 2.4.1981 sklepány ze zaschlých borových větví

Tetrops praeusta (L.) - 1 ex. sklepán z trnky 27.5.1981.

Starší nálezy jiných entomologů, nyní nepotvrzené:

Ergates faber (L.) - 1 ♀ 8.1953, leg. a in coll. Karban
Leptura rufipes Schall. - 6.1954 leg., in coll. Karban
Necydalis maior L. - 1 ex., leg. a in coll. Karban
Callidium aeneum Deg. - 2 ex. V. Nový leg., in coll.
Oberea pupilata (Gyll.) - 2 ex., leg., in coll. Karban

Závěr

Celkem bylo ve sledované oblasti zjištěno v uvedených letech 45 druhů tesaříků, avšak není vyloučen výskyt dalších druhů. Za zajímavější lze v této oblasti považovat výskyt druhů Pronocera angusta (Kriechb.), Chlorophorus herbsti (Brahm.) nebo Tetrops praeusta (L.).

Závěrem děkuji JUDr. M. Karbanovi za umožnění studia jeho sbírky a V. Novému za poskytnutí některých údajů.

Literatura

Heyrovský, L., 1955: Tesaříkovití - Cerambycidae. Fauna ČSSR. NČSAV, Praha.

Plíva, K., Průša, E., 1969: Typologické podklady pěstování lesů. Praha. SZN.

Summary

The cerambycids fauna of the Blatná surroundings (southern Bohemia) is described. This area has not been still more detailed examined. There are 45 species of family Cerambycidae living in surroundings of the Blatná. Among more interesting species from this region we can classify Pronocera angusta (Kriechb.), Chlorophorus herbsti (Brahm.) or Tetrops praeusta (L.).

DODATEK k přehledu zjištěných druhů :

skupina 2 Strangalia quadrifasciata (L.)
skupina 3 Pogonocherus decoratus Fairm.
skupina 4 Saperda similis Laich.- 1 ex.,7.1976,na listě jívy,Felbáb lgt.

Adresa autora (Author´s address) :

Jiří Simandl, Nerudova 1018, 388 01 Blatná