ny aedoeagu rovnoběžné a teprve těsně před apexem náhle zúžené. Z 30 zkoumaných samců z různých míst Československa zjistil jsem podle kopulačních orgánů Ch. concinna 22 x , Ch. heikertingeri 8 x, a to z lokalit: (od východu k západu) Slov. or. Turna n.B. 13.7.1946 Král. -- Sil.Besk.Staré Hamry 8.1943 Král. -- Mor.Mikulov 18.9.1960 Strejček. -- Boh.Libčany u Hr.Králové 20.10.1945 2 ex. Smetana. -- Boh.Želivka (Sedlické údolí) 14. 4.1965 Strejček. -- Boh.Heřm.Městec 1935 Kult. -- Boh.Obora u Plzně 1944 Brožík.

Zatím není možné o povaze nálezů u nás říci nic bližšího a bylo by třeba poznamenávat při sbírání těchto druhů přesnější údaje, např. výšku nebo zejména přesné (a kritické) označení živné rostliny. V úvahu přicházejí různé merlíkovité (mladá řepa!) a rdesnovité, např. Polygonum, Rumex.

Pisatel vyzval přítomné, aby věnovali sbírání obou druhů Chaetocnema pozornost a předávali mu nálezy k determinaci, zvláště pokud by byly doplněny podrobnými údaji o naleziští. Tím by taxonomické poznatky mohly být doplněny o bionomické.

DER ERDFLOH CHAETOCNEMA HEIKERTINGERI LUBISCHEV 1963 IN DER TSCHECHOSLOWAKEI (COLEOPTERA, ALTICIDAE)

Auf einer Arbeitssitzung der Entomologischen Gesellschaft am 19.Februar 1966 wurde vom Verfasser die jüngst von Chaetocnema concinna (Marshall 1802) abgetrennte Ch.heikertingeri Lubischev 1963 aus der Tschechoslowakei gemeldet und die Art demonstriert.

LITERATURA

L u b i s c h e v A.A., 1963: Dla novich palearktičeskich vida roda Chaetocnema gruppi Ch. concinna Marsh. (Coleoptera, Chrysomelidae, Halticinae). In: Entomologičeskoje obozrenije, 42: 858-863.

Josef K r á l

DASYPOLIA TEMPLI (THNBG.) (LEP., NOCTUIDAE) NA ŠUMAVĚ

Miloslav Kudla uvádí ve 4. čísle I.roč. "Zpráv" výskyt té-

to vzácné můry na Slovensku. Silnější výskyt z českých zemí uvádí toliko Sterneck v okolí Mariánských lázní, kde dr.Reiniger pochytal na 100 exemplářů na světelné zařízení, z něhož motýli nemohli uniknout.

K dosavadním znalostem o rozšíření tohoto druhu u nás chci přispěti výsledky svých sběrů ze šumavského pohraničí. Pravidelně nacházím D. templi (Thnbg.) již třetím rokem v okolí Lenory (okres Prachatice) a výsledky lovu jsou stále bohatší přesto, že jde vcelku o vzácný horský druh. Chytal jsem jej vždy jen na světlo. Spočátku jsem sbíral sedící exempláře v blízkosti zářivek pouličního osvětlení a teprve loňského roku pomocí jodové výbojky; tento způsob lovu byl mnohem úspěšnější.

Výskyt imag spadá přibližně do doby od konce září do začátku listopadu a je do značné míry závislý na počasí. Maximum spadá do začátku října. R. 1965 jsem tento druh chytal běžně od 27. září do 3. října; za hodinu přilétalo až 10 kusů. Později nepříznivé počasí podstatně omezilo nálet a ke konci října se tento motýl nevyskytl vůbec. Jarní (přezimovavší) exempláře jsem nikdy nezastihl, ačkoliv jsem po nich intenzivně pátral.

Nálet D. templi (Thnbg.) spadá do doby od setmění nejpozději do 20. hodin. Později zcela ustává, přestože jiné druhy stále ještě přiletují.

Z ostatních zajímavých druhů, které jsem chytal v okolí Lenory, zaznamenávám zde ještě např.: Amathes speciosa (Hb.), Moma ludifica (L.), Syngrapha interrogationis (L.), S. ain (Hochenw.), Cerura erminea (Esp.) aj.

DASYPOLIA TEMPLI (THNBG.) (LEP., NOCTUIDAE) IM BÖHMERWALDE

In Lenora bei Prachatice fange ich schon 3 Jahre diese Art ausschliesslich ans Licht. Der Anflug dauert nur bis 20 Uhr, später kommt keine D. templi (Thnbg.) zum Vorschein, obwohl andere Arten noch anfliegen. Der reichlichste Anflug dauert von Ende September bis Anfang Oktober. In diesem Zeitabschnitt konnte ich in einer Stunde bis zehn Exemplare erbeuten. Nach der Überwinterung habe ich D. templi (Thnbg.) ans Licht bisher nie gefangen.

LITERATURA

K u d l a M., 1965: Dasypolia templi (Thnbg.), nový druh

pro Slovensko. Zprávy Čs.spol.entom., 1 (4): 17. S t e r n e c k J., 1929: Prodromus der Schmetterlingsfauna Böhmens: 119, 261.

Emil L e h e č k a

DALŠÍ NÁLEZY TESAŘÍKŮ NA OLOMOUCKU (COL., CERAMBYCIDAE)

V Ročence muzeí Olomouckého kraje 1955 uveřejnil jsem seznam tesaříků obsahující 100 druhů, které byly od r. 1930 v okolí Olomouce zjištěny. V seznamu jsou i podrobné ekologické údaje těch druhů, které jsem získal pěstováním z larev, jakož i všechny zjištěné formy. V roce 1855 uveřejnil Eugen Klug seznam všech Coleopter, které zjistil v blízkém okolí Olomouce. V tomto přes 100 roků starém seznamu je uvedeno 51 druhů tesaříků, z nichž 13 jsem nověji nezjistil a do své práce nepojal.

Od roku 1955 bylo ve zdejším okolí zjištěno ještě 9 dalších druhů a řada forem. Mezi nimi je i Leptura dubia, kterou uváděl již Klug.

Nově nalezené druhy:

Leptura scutellata F. Na květech tužebníku, Hrubá Voda (jižní výběžky Nízkých Jeseníků).

Leptura dubia Scop. Hrubá Voda, kde je v některých letech na okoličnatých květech hojná. Zjištěny formy: ab.limbata Laich., ab. melanota Fald., ab. chamomillae F., ab. starcki Schilsky.

Obrium cantharinum L. Četně vychován ze suchého osikového dříví. Larva se vyvíjí pod kůrou. Lužní les "Království" u Grygova.

Stenopterus rufus L. Na kvetoucím hlohu počátkem června, vrch Chlum u Krčmaně.

Rhopalopus ungaricus Herbst. 7.8.1956 ulovena v letu 1 ♀, Hrubá Voda.

Pogonocherus decoratus Fairm. Sklepán s borovice, vrch Kosíř.

Acanthocinus griseus F. Při lovu motýlů na světlo přilétlo na různých místech v srpnu několik jedinců. Na smrkovém dříví chyceno několik kusů v Hrubé Vodě (lgt. Palásek).

Saperda punctata L. Na podzim r. 1961 nalezeno několik larev v jilmovém dřevě a vychována imaga. Střeň.

Phytoecia cylindrica L. Několik jedinců sesmýkáno v "Králov-