pro Slovensko. Zprávy Čs.spol.entom., 1 (4): 17. S t e r n e c k J., 1929: Prodromus der Schmetterlingsfauna Böhmens: 119, 261.

Emil L e h e č k a

DALŠÍ NÁLEZY TESAŘÍKŮ NA OLOMOUCKU (COL., CERAMBYCIDAE)

V Ročence muzeí Olomouckého kraje 1955 uveřejnil jsem seznam tesaříků obsahující 100 druhů, které byly od r. 1930 v okolí Olomouce zjištěny. V seznamu jsou i podrobné ekologické údaje těch druhů, které jsem získal pěstováním z larev, jakož i všechny zjištěné formy. V roce 1855 uveřejnil Eugen Klug seznam všech Coleopter, které zjistil v blízkém okolí Olomouce. V tomto přes 100 roků starém seznamu je uvedeno 51 druhů tesaříků, z nichž 13 jsem nověji nezjistil a do své práce nepojal.

Od roku 1955 bylo ve zdejším okolí zjištěno ještě 9 dalších druhů a řada forem. Mezi nimi je i Leptura dubia, kterou uváděl již Klug.

Nově nalezené druhy:

Leptura scutellata F. Na květech tužebníku, Hrubá Voda (jižní výběžky Nízkých Jeseníků).

Leptura dubia Scop. Hrubá Voda, kde je v některých letech na okoličnatých květech hojná. Zjištěny formy: ab.limbata Laich., ab. melanota Fald., ab. chamomillae F., ab. starcki Schilsky.

Obrium cantharinum L. Četně vychován ze suchého osikového dříví. Larva se vyvíjí pod kůrou. Lužní les "Království" u Grygova.

Stenopterus rufus L. Na kvetoucím hlohu počátkem června, vrch Chlum u Krčmaně.

Rhopalopus ungaricus Herbst. 7.8.1956 ulovena v letu 1 ♀, Hrubá Voda.

Pogonocherus decoratus Fairm. Sklepán s borovice, vrch Kosíř.

Acanthocinus griseus F. Při lovu motýlů na světlo přilétlo na různých místech v srpnu několik jedinců. Na smrkovém dříví chyceno několik kusů v Hrubé Vodě (lgt. Palásek).

Saperda punctata L. Na podzim r. 1961 nalezeno několik larev v jilmovém dřevě a vychována imaga. Střeň.

Phytoecia cylindrica L. Několik jedinců sesmýkáno v "Králov-

ství".

Nově zjištěné formy:

Pachyta 4-maculata L. ab. bimaculata Schönb. 1 ♂ Hrubá Voda.

Gaurotes virginea L. Zajímavě vybarvená ♀: Barva krovek tmavě purpurová.

Tetropium gabrieli Wse. ab. crawshayi Sharp. Vychován z larev, Lošov (lgt.Zapletal).

Xylotrechus pantherinus Sav. Vychoval jsem 17 nových odchylek kresby na krovkách. Nakreslenou tabulku těchto forem jsem uveřejnil v Ent.Zeitschrift, Stuttgart, 1964, 74: 33-36, avšak nepojmenoval. Vychována též barevná forma ab. brunescens Kudla.

Phymatodes alni ab. infuscatus Chevr. V několika kusech vychován společně s typickou formou "Království".

WEITERE UND ZUM TEIL FÜR DEN BEZIRK OLMÜTZ IN MÄHREN NEUE MELDUNGEN VON CERAMBYCIDEN

Im diesen Artikel werden neue Funde der Bockkäfer aus der mgebung von Olmütz angeführt.

Miloslav K u d l a

R Ů Z N É

Výbor Čs.společnosti entomologické při ČSAV pověřil s.Jaroslava Vaňka, Praha 7-Holešovice, Přístavní 19, opatřováním entomologických pomůcek pro členstvo.

Obracejte se proto se svými požadavky na výše uvedenou adresu.

Vydáno dne 30.června 1966.