

PHALACRUS BRISOUTI RYE - NOVÝ DRUH PRO ČSSR

(Coleoptera, Phalacridae)


Zdeněk Švec

Phalacrus brisouti Rye (syn. hybridus Flack, Gglb., fimetarius Thompson) patří k druhům s málo známým rozšířením. Vogt (in Harde, Freude, Lohse, 1967) a shodně Horion (1960) jej uvádějí ze západní Evropy. Z Československa dosud nebyl znám.

Ve svých sběrech jsem determinoval celkem 4 exempláře tohoto druhu ze tří lokalit na Moravě a na Slovensku : Lednice - 20.5.1983, Pouzdřany - 7.6.1985 a Štúrovo - 26.5.1986. Všechny kusy jsem sebral smykem, v Lednici a ve Štúrovu na vlhké louce, resp. vlhčím úhoru. Phalacrus brisouti Rye (viz obr.1) tak jako ostatní druhy rodu Phalacrus Payk. je mykofilní brouk se specifickými potravními nároky. Je znám z trávy válečky prapořité (Brachypodium pinnatum) napadené rzí.

Od ostatních našich druhů se liší lemem z nahloučených 9 - 11 ti trnů na vnější distální části předních holení a chagrínovanými krovkami. Je dobře determinovatelný podle samičích genitálií - ovipositoru. (detaily viz obr. 2 nákrasy a - c)

Obr. 1




Phalacrus brisouti Rye


Velikost : 2 - 3,5 mm

Zprávy Čs. společnosti entomologické při ČSAV,
Praha, 24, 1988


a) přední holeně



b) ovipositor



c) chagrinování krovek



Válečka prapořitá
Brachypodium pinnatum
(L.) P.Beauv.

Summary

The autor reports of a new finding of the species *Phalacrus brousoti* Rye for Czechoslovakia. The species was found in south Moravia and south Slovakia.

Literatura

- Freude H., Harde K.W., Lohse G.A., 1967 : Die Käfer Mitteleuropas.
Band 7. Krefeld
- Horion A., 1960 : Faunistik der mitteleuropäischen Käfer. Band VII.
Clavicornia. 1. Teil. Überlingen - Bodensee.

Adresa autora (Autor's address) :

Ing. Zdeněk Švec, Žerotínova 47, 130 00 Praha 3.