3. EVROPSKÝ ENTOMOLOGICKÝ KONGRES

Třetí evropský entomolgický kongres se konal ve dnech 24.-29.8. 1986 v Amsterdamu. Jeho pořadatelem byla holandská entomologická společnost se Svobodnou univerzitou (Vrie Universiteit, Amsterdam), v jejíchž prostorách se uskutečnila jednání jednotlivých sekcí. Kongresu se zúčastnilo přes 250 entomologů z 21 evropských a 10 mimoevropských zemí.

Na rozdíl od některých předcházejících entomologických kongresů, byl kongres v Amsterdamu tématicky orientován spíše na ekologickou a aplikovanou stránku entomologického výzkumu. Jednání kongresu byla rozdělena do 3 sekcí: 1) Životní cykly a ekologie vodního hmyzu, 2) Ekologické a fyziologické adaptace terestrického a půdního hmyzu a 3) Integrovaná ochrana rostlin a skladovaných produktů. Jednotlivé sekce probíhaly paralelně. Kromě toho byla do programu zařazena i plenární jednání s příspěvky pozvaných řečníků, kteří se snažili o širší syntetizující a objektivní pohled na tématiku jednotlivých sekcí (např. důležitost ekofyziologického výzkumu pro populační studia, ekologické adaptace mořského hmyzu, produkce povrchových vod, destrukce vodních biotopů ve Skandinávii, specificita ochrany hmyzu, ekologické důsledky hypotermické adaptace aj.). Je pochopitelné, že tyto plenární prezentace příspěvků měly různou úroveň, i když většina z nich byla skutečně vynikající (např. Prof. Z. Kajak, PLR nebo Dr. T. Wiederholm, Švédsko).

Pro většinu uvedených příspěvků (alespoň v sekci 1) byl charakteristický ekosystémový, nebo alespoň populační přístup ke sledované tématice, takže velice často došlo k překročení přístupu ryze entomologického směrem k širším souvislostem. Na druhé straně je však třeba poznamenat, že velmi často byl probírán a někdy i nadhodnocován vliv abiotických faktorů, zatímco ostatní ekologické faktory byly uvažovány pouze povrchně. Vedle otázek kontroly hmyzích populací byla velká pozornost věnována zejména biologii půdního hmyzu a vlivu antropogenních faktorů (např. acidifikace, těžké kovy, organické znečištění aj.) na hmyz. Bylo konstatováno, že ochrana hmyzího genofondu v Evropě je ve srovnání s ochranou např. obratlovců prozatím podceňována nebo chápána velmi jednostranně.

Je samozřejmé, že evropské entomologické kongresy nemohou být, už vzhledem k počtu účastníků a problematice většinou kontinentálního charakteru, srovnávány s kongresy světovými (10x více účastníků). Přesto však je zřejmé, že významně přispívají jak k rozvoji základního entomologického výzkumu, tak i k řešení některých otázek aplikovaného charakteru.

Tomáš Soldán