DVA NOVÉ DRUHY BROUKŮ PRO ÚZEMÍ MORAVY

ZWEI NEUE ARTEN KÄFERS FÜR DAS GEBIET MÄHRENS

(COLEOPTERA, BUPRESTIDAE, CERAMBYCIDAE)

Petr Čechovský

AGRILUS RIBESI Schaef.

V polovině června 1974 jsem na okraji Brna na listech černého rybízu (Ribes nigrum L.) chytil šest krasců z rodu Agrilus. Podle klíče rodu Agrilus (Bílý, 1977) a srovnáním s francouzskými exempláři Agrilus ribesi (Schaefer leg. et det.) ze sbírky J. Hladila a F. Navrátila bylo zjištěno, že se jedná o tento druh. Stejně determinoval (1978) exempláře z okolí Brna Bílý (in coll. Kubáň, Pacholátko leg.).

Tento druh byl původně popsán Schaeferem (1946) z Francie (dep. Cote d´Or) jako varieta k Agrilus viridis L. (také Schaefer 1949). Posléze sám autor opravil své tvrzení (1968), kde sbližuje exempláře chytané na černém rybízu s druhem Agrilus aurichalceus Redt. a povyšuje jej na samostatný druh.

RNDr. S. Bílý (1977) cituje jediný nález z ČSSR z území západního Slovenska (Malé Karpaty).

Dosavadní publikované rozšíření: Schaefer 1968, 1972: FRANCIE - departementy Cote d´Or, Allier, Saone-et-Loire, Oise, Nievère, Val -de -Marne, Jonne, Hérault. NĚMECKO - Berlin env. ITÁLIE - Piémont. Uváděn na Ribes nigrum L. a Ribes rubrum L.

Vývoj druhu byl na území ČSSR zjištěn v prutech živých keřů Ribes nigrum L., kde vyžírá několik desítek centimetrů dlouhou chodbu středem dřevní části; dá se označit jako škůdce, často totiž dochází k odeschnutí napadených prutů.

NOVÝ DRUH PRO MORAVU.

V poslední době byl zaznamenán i z jiných lokalit - Slavkov u Brna (Hladil), okolí Bratislavy (Korbel, Jendek, Kubáň), Plešivec (Čechovský, Kraus, Voříšek).

Tento druh byl dlouhou dobu přehlížen, teprve Schaeferem (1946) popsán jako varieta k Agrilus viridis L. a týmž autorem (1968) povýšen na druh, proto v dnešní době není ještě zcela známo celkové rozšíření

druhu. Lze však předpokládat jeho výskyt v celé střední a jižní Evropě. Otázkou je však přirozenost jeho šíření - vzhledem k jeho vývoji v živých rostlinách nelze vyloučit možnost zavlečení výsadbou této kulturní plodiny.

CALAMOBIUS FILUM (Rossi)

Podle Heyrovského (1955) se tento tesařík vyskytuje pouze na západním a jižním Slovensku v dosahu dunajského úvalu. Pozoruhodným byl nález RNDr. J. L. Stehlíka (V.1975), který tohoto brouka chytil smykem v katastru města Valtice, na jižním okraji Bořího lesa (det. P. Lauterer).

NOVÝ DRUH PRO MORAVU.

V posledních letech bylo chyceno více exemplářů na dalších moravských lokalitách - Břeclav env. (Kaláb, Bednařík), Lednice env. (Čechovský), Čejč env. (Jiříček, Kubáň, Čechovský).

Zusammenfassung

Der Autor erwähnt in seiner Arbeit über zwei neue Sorten der Käfer auf Mähren´s Territorium. Agrilus ribesi Schaef. - die wurden bisher aus Frankreich, Italien, Deutschland und West-Slowakei bekannt. Calamobius filum - diese Sorte hat sich nur in der Slowakei vorgefunden.

L i t e r a t u r a

Bílý, S., 1977: Klíč k určování čs. krasců (Buprestidae, Coleoptera). Academia, Praha, 40.

Heyrovský, L., 1955: Fauna ČSSR - sv. 5 - Cerambycidae. NČSAV, Praha.

Schaefer, L., 1946: L´Agrilus nuisible au cassis (Coleoptera, Buprestidae). Bulletin Soc. Linn. Lyon, 9: 107-108.

Schaefer, L., 1968: Coleoptéres nouveaux ou intéressants pour le Langue-doc-Rooussillon et confins, Ann. Soc. d´Horticulture et d´ Hist. Nat. Hérault, 108, 2: 77-79.

Schaefer, L., 1949: Les Buprestides de France. Éd. Scient. du Cabinet Entomologique, Paris.

Schaefer, L., 1972: Catalogue des Coleopteres Buprestides de France, Bull. Soc. Linn. Lyon, 8: 161-162.

Adresa autora (Anschrift des Autors) :

Petr Čechovský, Záhumenice 34, 619 00 Brno 19