

Z Čech je tento horský druh znám ze Šumavy a přilehlého území (Sterneck 1929, Levý 1948). Na Slovensku podle Hrubého (1964) se vyskytuje na četných místech oblasti tam označené B a C, které se vcelku shodují s místy výskytu Ph.bractea (F.).

BEITRAG ZUR VERBREITUNG VON PHYTOMETRA BRACTEA (F.) UND BOARMIA
MACULATA BASTELBERGERI HIRSCHKE IN MÄHREN (LEP.)

Der Autor führt Fundorte der genannten Schmetterlinge in Mähren an, von wo sie bisher nur sparsam zitiert wurden. Es konnte festgestellt werden, dass die beiden Arten, hier sowie in der Slowakei, ein ziemlich übereinstimmendes Verbreitungsgebiet aufweisen.

LITERATURA

H r u b ý K., 1964: Prodnromus Lepidopter Slovenska, Praha.
L e v ý J., 1948: Příspěvek k motýlí fauně jihočeské. Čas.Čs. spol.ent., 45: 160. S k a l a H., 1912: Die Lepidopterenfauna Mährens und Schlesiens. Verh.Nat.Ver., Brünn. S k a l a , 1936: Zur Lepidopterenfauna Mährens und Schlesiens. Ibidem. S t e r - n e c k J., 1929: Prodnromus der Schmetterlingsfauna Böhmens. Karlsbad. V o p r š a l Fr., 1940: Další zajímavosti z Karlštejnska (Lep.) Čas.Čs.spol.ent., 37: 5-15. W i c h r a J., 1949: Nová naleziště vzácnějších druhů motýlů v Čechách. Čas. Čs.spol.ent., 46: 173-180.

GYNANDROMORFIE U MOTÝLA DIAPHORA MENDICA (CL.)

Při chovu přástevníka vratičkového (Diaphora mendica/Cl./) z vajíček vylíhl se mezi normálními kusy jeden exemplář gynandromorní. Vajíčka pocházela od dvou samic sbíraných u Doloplasu u Olomouce 27.5.1952 (Bleša et Tomeček lgt.). Housenky se líhly počátkem června a z přezimovaných kulek se líhla imaga v dubnu 1953. Gynandromorf dne 27.4.1953. Jeho levá strana je bílá, samičí, pravá hnědá, samčí. Samičí přední křídla jsou na horním okraji 15 mm dlouhá, samčí měří 13 mm. Hruď je na levé straně chloupkovaná bíle, na pravé tmavohnědá. Zadeček je špičkově bílý s tenkými kroužky. Levé tykadlo je tenké jako u samic,

pravé hřebínkovité, samčí. Pokud je mi známo, nebyl u přástevníka vratičkového gynandromorf dosud pozorován.

GYNANDROMORFIE BEIM SCHMETTERLING DIAPHORA MENDICA (CL.)

Es wird über einen (wohl den ersten) Fall der Gynandromorphie bei Diaphora mendica (Cl.) berichtet.

P. Vincenc B l e š a

Pozn.red.: Gynandromorphie je spojení samičích a samčích druhotných pohlavních znaků na téže jedinci. Zpravidla mívá jedna polovina těla podobu samce, druhá polovina samice. Podle toho, jak jsou vyvinuty vlastní pohlavní orgány, může být gynandromorf pohlaví samčího, samičího nebo obojetník.

NÁLEZ BLECHY RHINOLOPHOPSYLLA UNIPECTINATA TASCHENBERG, 1880 NA NETOPÝRU BRVITĚM (MYOTIS EMARGINATUS)

Při kroužkování v letní kolónii samic netopýrů Myotis emarginatus Geoff. na půdě zámku v Jevišovicích na Moravě (okres Znojmo) dne 24.6.1965 jsem z kroužkovaných a kontrolovaných netopýrů sbíral parazity. Kromě roztoců jsem na jedné mladé samici našel i 2 kusy blechy Rhinolophopsylla unipectinata Taschenberg, 1880 (1 samce a 1 samici).

Tento druh byl v ČSSR zastižen jen na vrápencích Rhinolophus ferrumequinum, R. hipposideros, R. euryale a na létavci stěhovavém (Miniopterus schreibersi) (Rosický 1957). Odjinud je tento parazit znám z příslušníků rodu Myotis a Vespertilio, v ČSSR je to na netopýru rodu Myotis první nález.

FUND DES FLOHES RHINOLOPHOPSYLLA UNIPECTINATA TASCHENBERG, 1880 AUF DER FLEDERMAUS MYOTIS EMARGINATUS

Die genannte Flohart wurde bei uns bisher lediglich von den Arten Rhinolophus ferrumequinum, R. hipposideros, R. euryale und Miniopterus schreibersi bekannt. Mit einem Funde bei Jevišovice bei Znojmo in Mähren (24.6.1965 Haager lgt.) wurde dieser Floh bei uns das erste Mal auf Myotis emarginatus festgestellt.