

Jiří Mička

Pod názvem Krčský les je uváděn druhý největší lesní komplex na území dnešní Prahy. Skládá se z Krčského, Michelského a Kunratického lesa. Do mého faunistického výzkumu zahrnuji také území Lhotky a Libuše. Sběry a pozorování jsem prováděl v průběhu let 1973 až 1987.

Charakter krajiny

Počínaje od staré dolní Krče se táhne od Krčského nádraží až k rybníku u Labutě starý listnatý park. Od rybníka se prudce zcedá v zalesněný masivní val široký několik kilometrů, pod kterým protéká Kunratický potok. Ten je obklopen typickým lužním porostem (olše, lípa, vrba, jilm, habr, dub, brslen). Svahy zarůstají duby a habry. Na jižní straně svahu rostou zakrslé dubiny s hlohovými a šípkovými keři s typicky teplomilnou květenou. Nad svahem rostou různé konifery, dub, bříza, habr, lípa. Proto se zde vyskytují druhy hmyzu velice rozmanité a druhově bohaté.

Charakteristika podnebí

Je známo, že území Prahy je proti okolí poměrně teplejší díky svému vznikajícímu skleníkovému efektu, který se objevuje nad každým smogem znečištěným velkoměstem. Uvádím údaje z meteorologické stanice Praha-Libuš, měřené v roce 1986.

průměrná teplota v roce 1986 8,7 °C,
průměrná teplota od dubna do září 15,2 °C,
průměrná teplota od listopadu do března 2,2 °C,
průměr srážek naměřený v roce 1986 41,4 mm .

Přehled zjištěných druhů

1. *Prionus coriarius* (L.) - 15.7.1974 2 ex. sídliště Krč; 16.7.1975 dva ex. (Pšenička); 18.7.1980 dva ex. na pasece.
2. *Rhagium inquisitor* (L.) - na borových pařezech a metrech nehojný.
3. *Stenocorus quercus* (Götz) - 20.5.1983 1 ex. na hlohu (Kocina).

4. *Cortodera humeralis* (Schal.) - 28.5.1973 1 ex. v letu; 20.5.1984 1 ex. sklepaný z kvetoucího dubu.
5. *Grammoptera variegata* (Germ.) - 1 ex. v letu na kraji Lhoteckého lesa v květnu 1974.
6. *Grammoptera ruficornis* (F.) - na květech hlohů a okoličnatých rostlin hojná.
7. *Allosterna tabacicolor* (Deg.) - od května do srpna místy na květech hojná.
8. *Leptura rufipes* Schall. - od poloviny května do června na okoličnatých rostlinách hojná.
9. *Leptura sexguttata* F. - spolu s předchozím druhem, ale již méně hojná, převládá barevná odchylka *exclamationis*, 7.6.1986 1 ex. ab. *biguttata*; 15.6.1987 1 ex. ab. *nigra*.
10. *Leptura rubra* L. - 1 ex. 20.6.1983; jinak v pozdějších letních měsících hojná.
11. *Vadonia livida* (F.) - v červnu a červenci na květech šípků někdy hojná.
12. *Judolia cerambyciformis* (Schr.) - na okraji lesa a na pasekách je hojná v červnu a červenci.
13. *Judolia erratica* (Dalm.) - na jižních straních na květech okoličnatých rostlin méně hojný.
14. *Strangalia maculata* (Poda) - několik ex. v červnu 1973 na květech okoličnatých rostlin a od té doby nálezy nepotvrzeny.
15. *Strangalia aethiops* (Poda) - koncem května a začátkem června místy dost hojný druh na sluncem ozářených mytínách.
16. *Strangalia melanura* (L.) - v červnu na květech místy hojná.
17. *Strangalia bifasciata* (Müll.) - v červnu a červenci, ale již méně hojný druh.
18. *Criocephalus rusticus* (L.) - 1 ex. 20.6.1986 na světlo na sídlišti.
19. *Tetropium castaneum* (L.) - na smrkových metrech velmi hojný druh. Se základní formou i barev. odchylky *luridum*, *fulcratum* a *aulicum*.
20. *Tetropium gabrieli* Wse. - 7 ex. na modřínových metrech ve dnech 30.5. a 2.6.1983.
21. *Molorchus minor* (L.) - na smrkových metrech od dubna do června hojně.
22. *Rhopalopus spinicornis* Abeille - L. Heyrovský jej uvádí z Krče a z několika dalších míst okolo Prahy, ale velmi vzácný druh.
23. *Pronocera angusta* (Kriechb.) - 27.5.1987 vychován 1 ex. ze smrkové větve; 15.6.1987 vychovány další 2 ex. *Karaus*.
24. *Callidium violaceum* (L.) - na smrkových metrech někdy hojný, květen až červenec.

25. *Callidium aeneum* Deg. - 18.5.1986 11 ex. na smrkovém plotě;
19.5.1986 1 ex. (Karaus), 2 ex. (Říha).
26. *Pyrrhodium sanguineum* (L.) - v květnu 1983 jsem pozoroval několik
exempářů na dubových polenech.
27. *Phymatodes testaceus* (L.) - od května do července na dubových pole-
nech, místy hojný.
28. *Phymatodes alni* (L.) - 1 ex. 14.5.1973 na dubovém metru; 20.5.1984
1 ex. v letu.
29. *Plagionotus arcuatus* (L.) - 1 ex. mám ve sbírce s lokalitou Praha -
Krč, 14.5.1947 (K. Pospíšil).
30. *Plagionotus detritus* (L.) - 17.6.1984 2 ex. na dubovém metru
(Janata lgt.).
31. *Xylotrechus antilope* (Schönh.) - více ex. vychoval z dubových vět-
ví v roce 1987 (L. Karaus).
32. *Anaglyptus mysticus* (L.) - na květech okoličnatých rostlin a hlohů,
je místy hojný.
33. *Mesosa nebulosa* (F.) - 10.5.1983 1 ex. na suché dubové větvi.
34. *Pogonocherus hispidus* (L.) - 10.5.1987 ze suchých větví brsleny
7 ex. (ex. larvae).
35. *Acanthoderes clavipes* (Schränk.) - červen 1973 1 ex. uloven na
sídlišti v Krči (Krejčí lgt. Pšenička col.).
36. *Acanthocinus aedilis* (L.) - 24.4.1986 1 ex. na borové kládě.
37. *Liopus nebulosus* (L.) - od června do srpna hojný druh.
38. *Agapanthia villosoviridescens* (Deg.) - v květnu a v červnu hojná
na kopřivách.
39. *Oberea oculata* (L.) - červen 1960 1 ex. uloven v dolní Krči.
40. *Oberea pupilata* (Gyll.) - v červnu hojná na zimolezu *Lonicera*,
areál Thomayerova nemocnice.
41. *Oberea linearis* (L.) - 7.4.1972 1 ex. na sídlišti (Kratochvíl).
42. *Stenostola ferrea* (Schränk.) - několik ex. ze suchých lipových
větví (ex. larvae); červen 1982 1 ex. (Rejzek).
43. *Phytoecia coerulescens* (Scop.) - 20.6.1973 1 ex. v letu, Lhotka.
44. *Tetrops praeusta* (L.) - v květnu hojný na kvetoucím hlohu na jižních
stráních.

Předpokládám výskyt těchto dalších druhů :

Rhagium sycophanta (Schränk.), *Rhagium mordax* (Deg.), *Stenocorus meri-*
dianus (L.), *Cerambyx scopolii* Füssly, *Clytus arietis* (L.), *Hylotru-*
pes bajulus (L.), *Stenostola dubia* (Laich.) a dalších.

Z hlediska životního prostředí tvoří Krčský les neodmyslitelnou součást hlavního města Prahy. Je důležité, aby tento zajímavý komplex zůstal zachován ve své přírodní podobě a mohl tím plnit svou důležitou funkci zdroje kyslíku a také zachování biotopu žijící zvířeny. V posledních letech je stále více ohrožován exhalacemi z centra velkoměsta.

Dosavadním průzkumem jsem zjistil 44 druhů tesaříkovitých, z nichž za pozornost stojí *Stenocorus quercus* (Götz.), *Cortodera humeralis* (Schall.), *Leptura sexguttata* F., *Judolia erratica* (Dalm.), *Tetropium gabrieli* Wse., *Pronocera angusta* (Kriechb.), *Plagionotus detritus* (L.) a *Mesosa nebulosa* (F.). Na faunistickém průzkumu této oblasti pokračuji.

L i t e r a t u r a

Heyrovský L., 1955: Tesaříkovití-Cerambycidae, Fauna ČSR 5, ČSAV, Praha.

Adresa autora :

Jiří Mička, Ružinovská 1163, 142 00 Praha 4 - Krč.