FAUNA TESAŘÍKOVITÝCH V OBLASTI ŘÍČANSKA A CHKO VODĚRADSKÉ BUČINY

(Coleoptera - Cerambycidae)

Jan Hubert Jakub Prokop

Průzkum fauny tesaříkovitých jsme prováděli v okolí města u Prahy a CHKO Voděradské bučiny. Dále jsme do této práce zařadili seznam brouků zjištěných panem J.Komárkem v letech 1949 - 1980 a seznam brouků z Okresního muzea Praha-východ umístěných v muzeu v Říčanech, který sestavil pan Tichý.

Charakteristika území

V okolí Říčan tvoří porosty převážně smrková monokultura, místy se zde vyskytuje borovice a modřín. Listnaté stromy se vyskytují minimálně. Průměrná nadmořská výška 406 m.

Průměrné roční srážky 623 mm, průměrné roční teploty + 7,8 °C, počet dnů se sněhovou pokrývkou 60 - 80.

(Meterologická charakteristika Jaroš, 1985.)

V CHKO Voděradské bučiny tvoří porost převážně bučiny, občas sem proniká dub, bříza a smrk. Nadmořská výška se pohybuje v rozmezí 362 - 505 m, nejvyšší místo je kopec Kobyla.

Průměrné roční srážky 620-660 mm, průměrná roční teplota + 7,5 °C.

(Meterologická charakteristika Vyskot 1981.)

Materiál a metodika

Průzkum a pozorování jsme prováděli v letech 1983 - 1988 a sledovaná oblast tvoří obdelník 10 x 5 km. Materiál byl získávan individuálním sběrem, sklepáváním a smýkáním. Část materiálu jsme získali odchovem z larev. Zjištění druhy jsme rozdělili do skupin podle hojnosti pozorovaných exemplářů.

Přehled zjištěných druhů

I. druhy hojně se vyskytující v celé oblasti.

Rhagium mordax (Deg.)
Rhagium inquisitor (L.)
Strangalia maculata (Poda)
Strangalia melanura (L.)

Grammoptera ruficornis (F.)
Allosterna tabacicolor (Deg.)
Leptura rubra L.
Judolia cerambyciformis (Schr.)
Tetropium castaneum (L.)
Molorchus minor (L.)
Pyrrhidium sanquineum (L.)
Saperda populneua (L.)

II. druhy méně hojné, omezené na určitou lokalitu.

Leptura scutteleta F.
Vadonia livida (F.)
Strangalia quadrifasciata (L.)
Spondylis buprestoides (L.)
Criocephalus rusticus (L.)
Asemum striatum (L.)
Tetropium fuscum (F.)
Obrium brunneum (F.)
Callidium violaceum (L.)
Phymatodes testaceus (L.)
Phymatodes alni (L.)
Clytus arietis (L.)
Plagionotus arcuatus (L.)
Anaglyptus mysticus (L.)
Acanthacinus aedilis (L.)
Liopus nebulosus (L.)
Agapanthia villosoviridescens (Deg.)
Saperda scalaris (L.)

III. druhy řídce se vyskytující.

Prionus coriarius (L.)
Toxotus cursor (L.)
Tetropium gabrieli Wse
Molorchus umbellatarum (Schreb.)
Hylotrupes bajulus (L.)
Callidium aeneum Deg.
Pogonocheris hispidus (L.)
Oberea oculata (L.)
Stenostola dubia Laich.

IV. druhy vzácné, zjištěné jen v malém počtu exemplářů.

Cortodera femorata (F.) - 1 ex. V.1987 nalezen na trávě u smrkového lesa v Jevanech.
Saphanus piceus (Laich.) - 1 ex. 5. 3. 1988 vychován z pařezu v Říčanech
Pronocera angusta (Kriechb.) - 2 ex. vychované v V.1987 ze smrkových větví od Louňovic, spolu s následujícím
Clytus lama (Muls.) - 6 ex. vychováno v IV. 1987 ze smrkových větví.
Monochamus galloprovincialis (Ol.) - 1 ex. VII. 1988 uloven v letu nad borovými kládami, Vojkov.
Saperda carcharias (L.) - 2 ex. nalezeny VI.1986 na cestě u Říčan.

V. nálezy jiných entomologů.

J.Komárek = JK , M.Sléma = MS , Muzeum Říčany = MŘ.

Rhagium sycophanta (Schrank) - V.1949, Říčany, JK
Grammoptera variegata (Germ.) - V.1949, Říčany, JK
Leptura maculicornis Deg. - 30.6.1952, Louňovice, MŘ.
Necydalis maior L. - 5.VII.1976, Louňovice, JK.
Nothorina punctata (F.) - 1 ex. 7.V.1951, 1 ex. 30.VI.1953, 1 ex.

29.VI.1957, Jevany, JK.

Aromia moschata (L.) - 3.IX.1940, 23.VIII.1939, Říčany, MŘ.

Rhopalopus femoratus (L.) - VI.1936, Říčany ; 19.VI.1936, Louňovice, MŘ.

Lamia textor (L.) - V.1936, Říčany na vrbě, 28.VI.1952 Vojkov na cestě, MŘ.

Mesosa nebulosa (F.) - 9.VI.1979, Louňovice, JK.

Pogonocherus hispidulus (Pill.) - 8.VII.1936, Louňovice, MŘ.

Pogonocherus fasciculatus (Deg.) - 4.VII.1949, Říčany; 10.VIII.1951, Říčany; 12.VII.1955, Řířany, JK.

Pogonocherus decoratus Fair. - 22.VI.1979, Říčany, JK.

Pogonocherus ovatus (Goeze) - 20.XI.1983:; 20.XI.1983, Jevany v prosevu z jedle, JK.

Acanthocinus griseus (F.) - VII.1987, Říčany, na borové kládě, MS.

Oberea erythrocephala (Schrank.) - 20.6.1952, Říčany, MŘ.

Phytoecia coerulescens (Scop.) - 16.IV.1937; 9.VI.1957, Říčany, MŘ.

Phytoecia nigricornis (F.) - 27.V.1937; 9.VI.1937; 27.V.1940, Říčany, MŘ.

Tetrops praeusta (L.) - 19.V.1949; 25.V.1959; 15.V.1960, Říčany, JK.

Závěr

Průzkumem jsme zjistili ve sledované oblasti 45 druhů tesaříkovitých, se staršími nálezy je to celkem 63 druhů. Za nejzajímavější druh zjištěný v padesátých letech je možno považovat Nothorina punctata (F.). Lokalita, kde se tento druh vyskytoval je však dnes již zničená.

Z novějších významných nálezů je možno považovat druhy Saphanus piceus (Laich.) a Pronocera angusta (Kriechb.). Ve výzkumu této oblasti nadále pokračujeme.

Literatura

Heyrovský L., 1955 : Tesaříkovití - Cerambycidae. Fauna ČSR. Naklad. ČSAV, Praha.

Jaroš V., 1985 : Rokytka na okraji Prahy. Východočeské tiskárny, Pardubice.

Vyskot M., 1971 : Československé pralesy. Naklad.ČSAV, Praha.

Adresa autorů :

Jan Hubert, K.Marxe 1474/B, 251 01 Říčany u Prahy,
Jakub Prokop, Haškova 315, 251 01 Říčany u Prahy.