HELIOPHOBUS TEXTURATA ALPH. NA MORAVĚ (LEPIDOPTERA, NOCTUIDAE)
HELIOPHOBUS TEXTURATA ALPH. IN MÄHREN (LEPIDOPTERA, NOCTUIDAE)

Ladislav Traxler

Navazuji na příspěvek dr. F. Krampla ve Zprávách ČSSE 12: 73 - 75, ve kterém konstatuje zjištění této lokální můry na Slovensku, jako nový druh pro Slovensko. Do té doby byl tento druh v ČSSR znám pouze z Českého krasu a z jižních Čech. V letech 1978 - 1981 jsem na UV lampu chytil na Moravě několik exemplářů tohoto druhu a tak se mi podařilo prokázat jeho výskyt i na Moravě. Jde o lokalitu na sev. Moravě v okrese Šumperk, cca 5 - 7 km od Zábřehu na Moravě, v katastru obcí Vitošov a Hrabová. Jedná se o šupinu krystalického vápence (který je zde intenzivně těžen lomem Vitošov), směru cca SSZ - JJV, která je ohraničena na SV fylity zábřežské série a na JZ se na Bušínském zlomu noří hluboko pod štěrkopískové náplavy řeky Moravy. Vitošovský lom, kde jsem chytil 1 o 21. 7. 1978 na jeho horním okraji, leží ve strmém svahu v nadmořské výšce cca 300 - cca 450 m.n.m. Hrabová, kde jsem chytil 26.6. 1979 1 o a 29.5. 1981 3 o, se nachází v mírném svahu s průměrnou výškou cca 300 m.n.m. Obě lokality se nachází do vzdálenosti 100m od vzrostlého smíšeného lesa (převažuje buk, dub, modřín a jasan). Domnívám se, že lze očekávat výskyt tohoto druhu i na jiných vápencových lokalitách Moravy.

Správnost determinace překontroloval v roce 1983 ing. Kristian Krušek, za což mu touto cestou děkuji. Dokladové exempláře jsou uloženy ve sbírce autora.

Adresa autora /Anschrift des Autors/:

Ing. Ladislav Traxler, Únorová 359, 530 03 Pardubice 3