Zprávy Čs. spol. entom., 28 (1992), č. 2-4, s. 59-60

Nález *Sitaris muralis* Forst. (Coleoptera, Meloidae) v katastrálním území Blížkovice, okres Znojmo

Fund von *Sitaris muralis* Forst. (Coleoptera, Meloidae) in Blížkovice, Bezirk Znojmo

Vladimír Vláčil

Dvořák (1983) v klíči k určování brouků čeledi Meloidae uvádí jediný nález druhu *Sitaris muralis* na Moravě, a to Pouzdřany (Hoffer 1965). Vzhledem k tomu, že od vydání klíče uplynulo 10 let, je možno v tomto mezidobí předpokládat další nálezy. Jedním z nich je i můj nález *Sitaris muralis* Forst. v kat. území Blížkovice.

Brouka jsem nalezl celkem v 24 exemplářích, 11 oo a 13 oo, a to v období 31.8. až 21.9.1991. První 3 exempláře jsem nalezl na dvoře a na plotě, ostatní na půdě chalupy, která slouží naší rodině k rekreaci. Chalupa je přes sto let starý objekt, samota asi 5 km jihozápadně od obce Blížkovice. Podlahu na půdě tvoří zhruba 5 cm silný hlinitý potěr, ve kterém hnízdí zední včely (zřejmě druh *Anthophora acervorum).* Po delším pátrání, neboť na půdu se nechodí často, jsem zjistil, že brouk se rojí odtud. Téměr v každém otvoru v hliněné podlaze bylo možno vidět 2 až 3 brouky. Několik exemplářů jsem zde našel mrtvých. Musím v souvislosti s tím uvést, že předcházející rok (1990) byl na lokalitě velmi bohatý výskyt blanokřídlého hmyzu, zejména nadčeledí Vespoidea a Apoidea. Naopak v roce nálezu (1991) byl výskyt uvedených blanokřídlých mimořádně slabý.

Pro úplnost uvádím také bližší údaje o lokalitě. Chalupa stojí o samotě na styku lesa, louky a pole. Převládá lesní prostředí. Nadmořská výška zhruba 420 m, faunistický čtverec 6070 (Zelený 1972). Terén je rovinatý.

Nález druhu byl potvrzen i v letošním roce. V období 16. až 23. srpna 1992 jsem nalezl opět na půdě chalupy dalších 9 exemplářů, a to 2 oo a 7 oo. V obou letech byla minimálně polovina nalezených jedinců ponechána na místě k zachování populace.

ZUSAMMENFASSUNG

In dem Bericht ist der Fund eines selten vorkommenden Käfers *Sitaris muralis* Forst. (Coleoptera, Meloidae) in dem südwestlichen Teil von Mähren (Blížkovice, Bezirk Znojmo, faun. Feld 6070) angeführt.

Der Autor hat im Jahre 1991 (31.8 - 21.9.) 24 Exemplare und im Jahre 1992 (16. - 23.8.) 9 Exemplare, zusammen 33, davon 13 Männchen und 20 Weibchen, auf dem Dachboden des etwa 100 Jahre alten Hegerhauses gesammelt. Der Käfer entwickelt sich hier wahrscheinlich in den Nestern von *Anthophora acervorum* (Hymenoptera, Anthophoridae).

LITERATURA

Dvořák M. 1983: Majkovití brouci Československa. Zprávy Čs. spol. entomol., Suppl.: Klíče k určování hmyzu, 4 : 1-39.

Hoffer A., 1965: Nález Sitaris muralis Forst. (Col., Meloidae) na jižní Moravě. Zprávy Čs. spol. entomol., 1(1) : 10-11.

Zelený J., 1972: Návrh členění Československa pro faunistický výzkum. Zprávy Čs. spol. entomol., 8 : 3-16.

Adresa autora: Vladimír Vláčil, Voříškova 51, 623 00 Brno.

Fibiger M., 1990: Noctuidae Europaeae.
Volume 1. Noctuinae I., Entomological Press Soro, 208 pp.

Koncem roku 1990 vyšla 1. část plánované dvanáctidílné série „Noctuidae Europaeae". Autorem této části je Michael Fibiger, dánský lepidopterolog, přední evropský specialista na čeleď Noctuidae. 1. svazek uvedené řady obsahuje část druhů podčeledi Noctuinae. Z celkového počtu 242 evropských druhů této podčeledi je zde zahrnuto 133 druhů patřících 16 rodům (rody Euxoa-Standfussiana). Použitý systém v zásadě odpovídá systému Hartiga a Heinickeho (1973). Kniha přináší řadu systematických a nomenklatorických změn, je uveden popis 2 nových druhů (Agrotis yelai ze středního Španělska a Euxoa mobergi z Anatolie), 9 subspecií, naopak řada druhových a poddruhových jmen je synonymizována.

Celý text je psán souběžně anglicky a francouzsky. U každého druhu je uvedena citace původního popisu, locus typicus, chronologicky všechna synonyma, dále stručná diagnóza, bionomické informace, rozšíření a případné poznámky. Rozšíření každého druhu je znázorněno plošně na připojené mapce. Dospělci popisovaných druhů jsou zobrazeni na 16 barevných fotografických tabulích. V charakteristikách jednotlivých druhů schází až na výjimky popis morfologie kopulačních orgánů, kterým by měl být věnován samostatně 3. svazek.

Kniha je výsledkem mnohaletého shromažďování informací, studia původních popisů, typového materiálu i terénních výzkumů. Je po formální i obsahové stránce precizně zpracována, jak jsme si již v posledních letech u skandinávské lepidopterologické literatury zvykli. Hranice areálů na připojených mapkách jsou poněkud zjednodušeny, což vedlo někdy k určitým nepřesnostem i v případě několika našich druhů. Rovněž rozlišovací znaky ve skupinách velmi podobných druhů mohly být snad poněkud podrobněji popsány.

Doufejme, že série „Noctuidae Europaeae" vyřeší desítky let existující nedostatek vhodných pomůcek použitelných celoevropsky při studiu a determinaci můrovitých a nahradí tak již poněkud zastaralá díla Spulera a Seitze. Bohužel pro většinu našich lepidopterologů bude zřejmě cenově nedostupná (cena 1. dílu je 680,- DKK), přesto by neměla chybět alespoň na významných entomologických pracovištích a v důležitých knihovnách.

Zdeněk Laštůvka