LITERATURA

Dvořák M. 1983: Majkovití brouci Československa. Zprávy Čs. spol. entomol., Suppl.: Klíče k určování hmyzu, 4 : 1-39.

Hoffer A., 1965: Nález Sitaris muralis Forst. (Col., Meloidae) na jižní Moravě. Zprávy Čs. spol. entomol., 1(1) : 10-11.

Zelený J., 1972: Návrh členění Československa pro faunistický výzkum. Zprávy Čs. spol. entomol., 8 : 3-16.

Adresa autora: Vladimír Vláčil, Voříškova 51, 623 00 Brno.

Fibiger M., 1990: Noctuidae Europaeae.
Volume 1. Noctuinae I., Entomological Press Soro, 208 pp.

Koncem roku 1990 vyšla 1. část plánované dvanáctidílné série „Noctuidae Europaeae". Autorem této části je Michael Fibiger, dánský lepidopterolog, přední evropský specialista na čeleď Noctuidae. 1. svazek uvedené řady obsahuje část druhů podčeledi Noctuinae. Z celkového počtu 242 evropských druhů této podčeledi je zde zahrnuto 133 druhů patřících 16 rodům (rody Euxoa-Standfussiana). Použitý systém v zásadě odpovídá systému Hartiga a Heinickeho (1973). Kniha přináší řadu systematických a nomenklatorických změn, je uveden popis 2 nových druhů (Agrotis yelai ze středního Španělska a Euxoa mobergi z Anatolie), 9 subspecií, naopak řada druhových a poddruhových jmen je synonymizována.

Celý text je psán souběžně anglicky a francouzsky. U každého druhu je uvedena citace původního popisu, locus typicus, chronologicky všechna synonyma, dále stručná diagnóza, bionomické informace, rozšíření a případné poznámky. Rozšíření každého druhu je znázorněno plošně na připojené mapce. Dospělci popisovaných druhů jsou zobrazeni na 16 barevných fotografických tabulích. V charakteristikách jednotlivých druhů schází až na výjimky popis morfologie kopulačních orgánů, kterým by měl být věnován samostatně 3. svazek.

Kniha je výsledkem mnohaletého shromažďování informací, studia původních popisů, typového materiálu i terénních výzkumů. Je po formální i obsahové stránce precizně zpracována, jak jsme si již v posledních letech u skandinávské lepidopterologické literatury zvykli. Hranice areálů na připojených mapkách jsou poněkud zjednodušeny, což vedlo někdy k určitým nepřesnostem i v případě několika našich druhů. Rovněž rozlišovací znaky ve skupinách velmi podobných druhů mohly být snad poněkud podrobněji popsány.

Doufejme, že série „Noctuidae Europaeae" vyřeší desítky let existující nedostatek vhodných pomůcek použitelných celoevropsky při studiu a determinaci můrovitých a nahradí tak již poněkud zastaralá díla Spulera a Seitze. Bohužel pro většinu našich lepidopterologů bude zřejmě cenově nedostupná (cena 1. dílu je 680,- DKK), přesto by neměla chybět alespoň na významných entomologických pracovištích a v důležitých knihovnách.

Zdeněk Laštůvka