

Motýli okresu Teplice

The Lepidoptera of the district Teplice

Karel Duchek a Jiří Skoupý

ÚVOD

Tato faunistická práce je zaměřena do regionu bývalého okresu Teplice. Jedná se zejména o nejbližší okolí města, obec Bystřany, Bohosudov - Krupku, vrchy Rač a Jedovina u Habří. Dotýká se také méně prozkoumaných a vzdálenějších lokalit jako je Cínovec, vrcholové rašeliniště v Novém Městě - Moldavě, Kostomlaty. Je zde také uvedeno několik málo údajů z lokalit již dost vzdálených - Lovosice, Třebenice a Raná u Loun, jedná se však zejména o druhy, které se v blízkém okolí města Teplic nevyskytují.

Zkoumaná oblast je poměrně velká, členitá a podle nás dosud nedostatečně prozkoumaná. Také typy lokalit jsou zde velmi různorodé, od stepních enkláv přes vápencové lomy, lesostepní útvary, smíšené lesy, vlhké louky, břehové porosty potoků až po vrcholové rašeliniště. Jsou zde však také obrovské plochy zdevastovaných lesů - tzv. holin na hřebtech Krušných hor, plochy intenzivně zemědělsky využívané, a v neposledním případě rozlehlé povrchové doly s výsypkami hlusiny, bezprostředně navazujícími na SPR Rač u Habří. Zde je pak zajímavá otázka znovuosidlování výsypek na úpatí tohoto vrchu a vrchu Jedovina, kde jsme v posledních letech pravidelně lovíli *Pontia daplidice* a to i v gen. vern. *belidice*. Na porostech vrbovek jsme na hlušinách sbírali v některých letech velmi hojně housenky *Celerio galii* a jednotlivě housenky *Proserpinus proserpina*.

Mezi zajímavé nálezy z této oblasti pak jistě patří *Noctua interjecta*, *Oligia fasciuncula*, *Mythimna sicula*, *Atethmia ambusta* a *Perizoma bifaciata*.

Tato práce odráží výsledky sběrů posledních sedmi let, u Rhopalocer pak od roku 1974 a jen několik málo údajů z šedesátých let pochází ze sbírky zesnulého pana Jaroslava Duška. Sbírkový materiál je uložen u níže uvedených sběratelů, sbírka pana Duška je v držení jeho ženy.

Ve speciální části je za latinským jménem a zkratkou jména autora uvedena lokalita a datum nálezu taxonu, v případě tří a více druhů exemplářů uváděného druhu na lokalitě je uvedena jen všeobecná charakteristika jeho výskytu na této lokalitě nebo v celé oblasti. Nomenklatura je zde použita dle Forstera a Wohlfahrta.

Chceme zde také poděkovat všem, kteří nám pomohli, za jejich pomoc a za poskytnutí sběrového materiálu. Zejména pak chceme poděkovat pánům Kruškovi, Kramplovi, Rennerovi a Šmelhausovi za jejich pomoc a determinaci některých druhů z čeledí Noctuidae, Geometridae a Zygaenidae.

Závěrem chceme ještě poznamenat, že faunistický výzkum této oblasti není zdaleka ukončen a do budoucna se chceme věnovat i čeledím ze skupiny tzv. mikrolepidopter a tak uvítáme jakoukoli pomoc při této práci.

Materiálové prameny:

Abert Pavel - A, Duchek Karel - D, Dušek Jaroslav - Dš, Feit Petr - F, Píbl Václav - P, Skoupý Jiří - S, Thomas Jiří - T.

Seznam lokalit a jejich kódů (Novák, 1989):

1. Bystřany	5349	18. Nové Město	5247
2. Bohosudov	5349	19. Opárno	5450
3. Bořislav	5449	20. Rač	5349
4. Bžany	5449	21. Radobýl	5450
5. Cínovec	5248	22. Raná u Loun	5548
6. Dubí	5348	23. Rtyně	5349
7. Dubice	5450	24. Střelná	5348
8. Habří	5349	25. Štrbice	5448
9. Jedovina	5349	26. Teplice	5348 - 49
10. Komáří hůrka	5248	27. Teplický vrch	5449
11. Kostomlaty	5449	28. Třeбенice	5549
12. Krupka	5349	29. Ústí nad Labem	5350
13. Litoměřice	5450	30. Velvěty	5349
14. Lovosice	5450	31. Vlastislav	5449
15. Lovoš	5450	32. Žalany	5449
16. Lysec	5349	33. Žichlice	5349
17. Moldava	5247		

SPECIELNÍ ČÁST

Papilionidae

Papilio machaon L. - nehojně ve dvou generacích, Bystřany D, S, T; Teplice D, P, S; Rač P, S.

Iphiclides podalirius L. - nehojně v jedné generaci, výjimečně částečná druhá generace, Bystřany D, Dš, S, T; Štrbice D, P, S; Jedovina a Rač S, P.

Pieridae

Aporia crataegi L. - 8.-12.6.1963 Bystřany Dš, 7.6.1963 Velvěty Dš.

Pieris brassicae L. - hojný ve dvou generacích, lok. 1-6, 8, 9, 11, 12, 20, 22, 26-28.

Pieris rapae L. - hojný ve dvou generacích, jako předešlý druh.

Pieris napi L. - velmi hojný ve dvou až třech generacích, lok. 1-6, 8, 9, 11, 12, 20, 22, 26-28.

Pontia daplidice L. - jednotlivé nálezy, pouze na lokalitách Jedovina a Rač se vyskytuje pravidelně ve dvou generacích, VII. 1975-76 Bystřany D, S;

- VIII. 1988 Bystřany S; 28. 4. 1964 Lysec Dš; IV. - V. a VII. - VIII. Jedovina a Rač D, P, S, T, F.
- Anthocharis cardamines* L. - lokální, ale dosti hojný, Bystřany, Teplice, Kostomlaty, Bohosudov, D, S, P, T, F.
- Gonepteryx rhamni* L. - rozšířený, nehojný, Bystřany, Teplice D, S, P.
- Colias hyale* L. - rozšířený a hojný, pravděpodobně v materiálu tohoto druhu i *C. australis*.
- Colias australis* Vrtý. - jako výše uvedený druh, zatím bez spolehlivé determinace imág, jež se v některých případech nedají spolehlivě určit, v budoucnu se zaměříme na determinaci v larválním stadiu.
- Leptidea sinapis* L. - rozšířený, nehojný ve dvou generacích, lok. 1, 2, 8, 9.
- Satyridae**
- Erebia ligea* L. - prakticky jen ve vrcholových partiích Krušných hor, Cínovec, Moldava D, F, S, P.
- Erebia medusa* Schiff. - lokální, poměrně hojný, lok. 1, 2, 5, 6, 8 - 10, 12.
- Agapetes galathea* L. - rozšířený a hojný, lok. 1, 2, 8, 9, 12, 14, 15, 20, 22, 25-28.
- Hipparchia semele* L. - ojediněle, VII. 1973-75 Bystřany D, S; 26.7. 1988 Bořislav P, 12.8. 1984 Štrbice P.
- Chazara briseis* L. - jediná lokalita, prakticky již mimo okres Teplice - Raná u Loun, velmi hojný D, S.
- Minois dryas* Scop. - velmi lokální a na lokalitě velmi hojný - Lovoš D, F, S, P.
- Aphantopus hyperantus* L. - velmi hojný, všude lok. 1 - 33.
- Pararge aegeria* L. - lokálně, nehojný, Cínovec D, S; Kostomlaty D, F, S, P; 21. 8. 1984 Bystřany S.
- Dira megera* L. - velmi hojný, prakticky všude lok. 1-6, 8, 9, 11, 12, 20, 22, 26 - 28.
- Dira maera* L. - lokální, ale hojný, Cínovec a Dubí D, S; Kostomlaty P.
- Maniola jurtina* L. - velmi hojný, všude lok. 1-33
- Hyponephele lycaon* Rott. - velmi lokální, jednotlivě, Raná D, S.
- Coenonympha iphis* Schiff. - lokální, nehojný, Dubice S.
- Coenonympha pamphilus* L. - všude velmi hojný lok. 1 - 33.
- Nymphalidae**
- Apatura iris* L. - 21. 6. 1976 Kostomlaty, lgt. F. Křofanda coll. Thomas VI - VII. 1992 Kostomlaty S, F.
- Limenitis camilla* L. - v současnosti nepotvrzený, 7.7. 1963 Bořislav Dš, 19. 7. 1964 Žim Dš, 26.7. 1964 Černčice Dš.
- Limenitis populi* L. - lokální, velmi jednotlivě, 30. 6. 1965 Milešovka Dš, 19.6. 1968 Kostomlaty Dš, 23.6. 1968 Bořislav Dš, 21. 6. 1975 Kostomlaty Křofanda, 15. 6. 1986 Teplický vrch S, 5. 7. 1987 Kostomlaty S, 14. 6. 1992 Kostomlaty S.
- Vanessa atalanta* L. - migrant, hojná, lok. 1, 2, 5, 6, 8, 9, 12, 15, 20, 22, 26-28.
- Vanessa cardui* L. - jako předešlý druh.

- Aglais urticae* L. - v celé oblasti velmi hojný lok. 1 - 33.
Inachis io L. - v celé oblasti velmi hojný lok. 1 - 33.
Nymphalis polychloros L. - lokální, nehojná, 2. 5. 1976 Bystřany D, IV. Teplický vrch D, S, P, T; 24. 7. 1987 Bohosudov S.
Nymphalis antiopa L. - jednotlivě, 27. 9. 1986 Bystřany D, 15. 8. 1986 Bystřany S, IV. Teplický vrch D, S, P, 23. 7. 1991 Bohosudov D.
Polygonia c-album L. - velmi rozšířený, nehojný druh, lok. 1, 2, 6, 8, 9, 20, 26-28.
Araschnia levana L. - rozšířený a hojný druh, lok. 1, 2, 5, 6, 8, 9, 12, 15, 20, 26-28.
Melitaea athalia Rott. - v současnosti nepotvrzen, 6. 7. 1974 Bohosudov D, S.
Melitaea cinxia L. - jako předešlý druh, VI. 1964 Žim Dš.
Fabriciana adippe Rott. - rozšířený, jednotlivě se vyskytující druh, 6. 7. 1974 a 8. 8. 1976 Bystřany D, S; 28. 7. 1983 Kostomlaty D, 21. 8. 1984 Rač S, Bohosudov D, S.
Argynis paphia L. - lokální, velmi jednotlivě, VIII. 1984 Kostomlaty D, S.
Brenthis ino Rott. - lokální, nehojný, VIII. Kostomlaty S
Clossiana selene Schiff. - poměrně lokální, nehojný, VI. 1974 Bystřany D, Rač D, S, P; Bohosudov D, F, S, P.
Clossiana dia L. - nehojný, Bystřany, Bohosudov, Rač, Kostomlaty D, F, S, P, T.
Issoria lathonia L. - hojný v celé oblasti, lok. 1, 2, 5, 6, 8, 9, 12, 15, 20, 26-28
Riodinidae
Nemeobius lucina L. - velmi lokální, jednotlivě, 4. 6. 1985 Kostomlaty S, 9. 6. 1991 Vlastislav D, S.
Lycaenidae
Thecla quercus L. - rozšířený a hojný druh, lok. 1-3, 5, 6, 12, 15, 26-28.
Thecla betulae L. - jednotlivě, 15. 8. 1986 a 22. 8. 1987 Bystřany S, 10. 8. 1986 Jedovina T, IX. 1988 Teplice P.
Strymon acaciae F. - lokální, 30. 6. 1985 Štrbice D, VI. 1991 Rač - hojný F, S.
Strymon spini Schiff. - rozšířený, ale nehojný, Bystřany D, S, A; Rač S.
Strymon w-album Knoch. - mizející druh, 22. 7. 1974, 6. 7. 1975 a 5. 7. 1985 Bystřany D, S; 22. 6. 1979 Rač P
Strymon pruni L. - jednotlivě, 1974-75 Bystřany D, S; VI. 1989 Bystřany S, 14. 6. 1986 Žichlice S, 15. 6. 1986 Bžany S, VI. Dubice P, S.
Callophrys rubi L. - nehojně, Bystřany, Štrbice D, S; Rač T.
Heodes virgaureae L. - kdysi velmi hojný, mizející druh, lok. 1-3, 5, 6, 11, 12, 26.
Heodes tityrus Poda - lokální a nehojný, Bohosudov D, S, P; Rač T.
Lycaena phlaeas L. - nehojně v celé oblasti, lok. 1-35, 6, 8, 9, 12, 15, 20, 25-28
Palaeochrysophanus hippothoe L. - lokální, na stanovišti hojný, Cínovec D, S; Moldava D, S, P, F.
Evers argiades Pall. - v současnosti nepotvrzený druh, 24. 7. 1973 D a 3. 8. 1974 S Bystřany.

- Cupido minimus* Fuessl. - na jediné lokalitě mimo okres - Lovosice F, S, hojný.
- Celastrina argiolus* L. - v celé oblasti, nehojný, lok. 1-3, 5-9, 11-15, 20, 25-28.
- Scolitantides orion* Pall. - jediný údaj mimo studovanou oblast 11. 6. 1988 Radobýl S.
- Philotes vicrama* Moore - lokální na lokalitě poměrně hojný druh Rač D, F, S, P, T; 27. 5. 1984 Štrbice S.
- Glaucopsyche alexis* Poda - jednotlivě, Bystřany D, S; Štrbice D, A, S, P, T; 20. 5. 1989 Bohosudov D.
- Maculinea teleius* Bergstr. - velmi lokální, jednotlivě se vyskytující druh, Bohosudov D, S, F, P; Střelná D, S, P.
- Maculinea nausithous* Bergstr. - velmi lokální, ale velmi hojný, Bohosudov A, D, F, S, P; Střelná D, S, F, P.
- Lycaeides argyrognomon* Bergstr. - velmi hojný v celém regionu, lok. 1-3, 5, 6, 8, 9, 15, 20, 26-28.
- Aricia agestis* Schiff. - nehojně, lok. 1-3, 5, 6, 8, 9, 11, 15, 26.
- Eumedonia chiron* Rott. - jednotlivě, 6. 8. 1974 a 12. 7. 1975 Bystřany D, S; 5. 7. 1974 Žim DŠ; 26. 6. 1990 Bystřany, 17. 6. 1990 Opárno S; 23. 6. 1992 Bystřany S.
- Cyaniris semiargus* Rott. - lokální a nehojný druh, Bohosudov A, D, F, S, P; 12. 7. 1987 Kostomlaty a 17. 6. 1990 Opárno S.
- Polyommatus icarus* Rott. - hojný v celé oblasti, lok. 1-3, 5, 6, 8, 9, 15, 20, 26-28.
- Lysandra icarius (amandus)* Esp. - lokální, na stanovištích velmi hojný druh, Bystřany A, D, F, S, T, P; Bohosudov A, D, S, P; Dubice S.
- Lysandra coridon* Poda - velmi hojný, Bystřany, Teplice, Lysec D, F, S.
- Meleageria daphnis* Schiff. - jednotlivě, Bystřany D, F, S; Rač P.
- Hesperiidae**
- Erynnis tages* L. - hojný v celé oblasti, lok. 1-3, 5, 6, 8, 9, 15, 20, 26-28.
- Carchadorus alceae* Esp. - jednotlivě, 3. 8. 1974 Teplice D; 11. a 18. 8. 1984 Bystřany S; VIII. 1984, 1986 Jedovina D, S.
- Pyrgus malvae* L. - hojný v celé oblasti, lok. 1-3, 5, 6, 8, 9, 15, 26-28.
- Spialia sertorius* Hffmgg. - lokální a nehojný, 16. 5. 1974 Bystřany D; 20. 5. 1989 Bohosudov D, V; Rač D, S, T, F; 28. 5. 1989 Bystřany D.
- Carterocephalus palaemon* Pall. - hojný v celé oblasti, lok. 1-3, 5, 6, 8, 9, 15, 20, 26-28.
- Adopaea lineola* O. - nehojně, Bystřany S; Rač S.
- Adopaea silvester* Poda - jednotlivě, Bystřany S.
- Thymelicus acteon* Rott. - mimo sledovanou oblast - Raná D, S, F.
- Ochlodes venata* Brem. - nehojně, Bystřany, Bohosudov a Rač D, S.
- Hesperia comma* L. - nehojně, Bystřany D, S; Habří S.
- Lymantriidae**
- Dasychira pudibunda* L. - velmi hojný v celé oblasti, lok. 1, 8, 9, 11, 20, 26, 28.
- Orygia recens* Hbn. - nehojně, Bystřany D, S.

Arctornis L-nigrum Muell. - jednotlivě, lokální, VI. 1986 Kostomlaty S, T.
Leucoma salicis L. - jediný údaj z oblasti 14. 6.1989 Bystřany S.
Lymantria dispar L. - rozšířený a hojný druh, lok. 1, 2, 5, 6, 8, 9, 11, 20, 22, 25-28.

Lymantria monacha L. - jako předešlý druh
Euproctis chrysorrhoea L. - 6. 7. 1986 Kostomlaty S
Porthesia similis Fuessl. - 19. 6. 1974 Bystřany D

Arctiidae

Eilema lutarella L. - 22. 7. 1989 Bystřany S; 11. 8.1990 Rač S; VIII. 1991 Vlastislav D - velmi hojný
Eilema complana L. - poměrně hojný, Bystřany D, S; Rač D
Eilema lurideola Zincken- jediný údaj 3. 8. 1984 Dubí S. *sororcula* Hbn. - jediný údaj, mimo okres Teplice 6. 8. 1989 Raná S
Phragmatobia fuliginosa L. - velmi hojný, lok. 1, 2, 5, 6, 8, 9, 11, 22, 26-28
Eucharis casta Esp. - vzácný, jednotlivě, 6. 6. 1985 a 22. 6. 1983 Bystřany D, S; 30. 5. 1964 Bystřany Dš, 6. 6.1964 Velvěty Dš
Parasemia plantaginis L. - lokální, jednotlivě se vyskytující druh, 20. 6. 1984 Kostomlaty S; 28. 6. 1986 Cínovec S, Bohosudov P
Spilarcia lubricipeda L. - hojný v celé oblasti, lok. 1, 8, 9, 11, 26, 28
Spilosoma menthastris Esp. - jako předešlý druh
Cynia mendica Cl. - rozšířený a hojný, Bystřany, Teplice D, S, P
Diacrisia sannio L. - hojný, lok. 1-3, 8, 9, 20, 26-28
Arctia caja L. - hojný, lok. 1, 2, 8, 9, 26, 28
Panaxia dominula L. - ojedinělý nález Bystřany 6.7.1985 S
Panaxia quadripunctaria Poda - jednotlivě, Bystřany D, S, T; Rač a Jedovina S, F
Thyria jacobaeae L. - jeho jediná lokalita v oblasti byla přeměněna na pastvinu, 1983 - 85 Bystřany D, S, T

Notodontidae

Harpyia bicipis Brkh. - jediný údaj, 27. 5. 1989 Cínovec S
Harpyia hermelina Goeze - jednotlivě Bystřany D, S, T
Cerura vinula L. - ojediněle, 10.6.1970 Bystřany Dš, 8. 1979 larva Bystřany D; 22. 5. 1992 Bystřany S
Stauropus fagi L. - lokální druh, jednotlivě, 11.6.1978 a 4. 6. 1992 Bystřany S; 27. 6. 1986 Kostomlaty S, T
Hybocampa milhauseri F. - jednotlivě, Bystřany D, S, P, T
Drymonia trimacula ssp.
. *dodonaea* F. - lokální a nehojný druh, Bystřany S
Drymonia ruficornis Hufn. - nehojně, Bystřany D, S; Bohosudov A, S, P
Pheosia tremula Cl. - rozšířený a hojný druh, lok. 1, 2, 8, 9, 26, 28
Pheosia gnoma F. - rozšířený a poměrně hojný druh, lok. 1, 2, 8, 9, 26, 28
Notodonta phoebe Sieb. - jednotlivě, 1. a 4. 6. 1964 Dš, 24. 7. 1989 D, 11. 8. 1989 a 16. 7. 1990 S, vše Bystřany
Notodonta dromedarius L. - hojný v celé oblasti, lok. 1, 2, 8, 9, 26, 28
Notodonta ziczac L. - jako předešlý druh

Leucodonta bicoloria Schiff. - nehojný lokální druh, Bohosudov A, S, P
Lophopteryx camelina L. - rozšířený, ale nehojný, lok. 1, 2, 8, 9, 26, 28
Lophopteryx cuculla Esp. - jako předešlý druh
Pterostoma palpina L. - hojný, lok. 1, 2, 6, 8, 9, 26, 28
Phalera bucephala L. - jako předešlý druh
Clostera curtula L. - jednotlivé nálezy, 20.5.1989 D a 4. 5. 1990 S Bystřany

Zygaenidae

Jordanita globulariae Hbn. - jednotlivě, Kostomlaty D, S
Procris statices L. - rozšířený, v oblasti poměrně hojný druh, Bystřany D, S, F; Bohosudov D, S, P
Procris geryon Hbn. - ojedinělý nález, Bystřany 8. 6. 1986 S
Mesembrynus purpuralis Brünn. - lokální, ale na stanovišti velmi hojný druh, Bohosudov D, S, P, F
Lictoria achilleae Esp. - poměrně hojný druh, Bystřany, Bohosudov
Agrumenia carniolica Scop. - v oblasti lokální, hojný a velmi proměnlivý druh, Bohosudov A, D, S, P
Thermophila meliloti Esp. - lokální, hojnější, Bystřany, D, S
Zygaena filipendulae Scher. - lokálnější, nehojný druh, Bystřany S, Bohosudov D, S
Polymorpha ephialtes L. - poměrně hojná, lok. 1, 2, 8, 9, 15, 16, 28

Cochliidiidae

Apoda limacodes Hufn. - nehojně, Bystřany D, S

Sphingidae

Mimas tiliae L. - velmi rozšířený a hojný, lok. 1, 2, 26, 28
Laothoe populi L. - rozšířený, nehojný druh, Bystřany, Teplice
Smerinthus ocellata L. - rozšířený, jednotlivě Bystřany D, S; Teplice P
Acherontia atropos L. - tažný druh, 28.9. 1964 Velvěty e.l. DŠ, 1. 12. 1966 Bystřany e.l. DŠ, larva IX. 1983 D
Herse convolvuli L. - migrant, IX. 1976 Bystřany S, 23. 9. 1983 Bystřany D, 28. a 29. 9. 1991 Bystřany S, IX.1982 Teplice P
Sphinx ligustri L. - jednotlivě, 16. 6. 1963 Teplice DŠ, 14. 6. 1966 Rtyně DŠ, 23.5.1986 Bystřany S
Hyloicus pinastri L. - v oblasti lokální a nehojný, Kostomlaty S, T; Teplice P; 5. 6. 1992 Bystřany S
Celerio euphorbiae L. - jediný údaj z oblasti, 6. 7.1985 Bystřany S
Celerio galii Rott. - v imaginálním stadiu se vyskytuje jednotlivě v celé oblasti, v larválním stadiu se v některých letech masově vyskytuje na porostech vrbovky na výsypkách povrchových dolů
Deilephila elpenor L. - hojný v celé oblasti
Deilephila porcellus L. - hojný v celé oblasti
Proserpinus proserpina Pall. - v larválním stadiu se jednotlivě vyskytuje na stejných místech jako C. galii, jako imago byl odchycen jeden exemplář 22. 6. 1991 Rač D, Jedovina D, S, P, T
Macroglossum stellatarum L. - migrant, jednotlivě

Hemaris fuciformis L. - 15. 8. 1983 Teplice P; 19. 6. 1988 Bohosudov S a 1. 8. 1992 Bystřany S

Thyatiridae

Habrosyne pyritoides Hufn. - rozšířený a hojný druh v oblasti, lok. 1, 2, 26, 28

Thyatira batis L. - jako předešlý druh

Tethea duplaris L. - velmi jednotlivě, 24. 7. 1989 Bystřany D; 28. 7. 1990 Bystřany S

Tethea or Schiff. - nehojně, Bystřany D, S

Polyploca flavicornis L. - jednotlivě, Bystřany 9. 4. 1985 D a 17. 3. 1990 S

Polyploca ridens F. - poměrně hojně, Bystřany D, S

Drepanidae

Drepana falcataria L. - rozšířený a velmi hojný, lok. 1, 2, 26, 28

Drepana lacertinaria L. - nehojný, Bystřany D, S

Drepana binaria Hufn. - nehojný, Bystřany D, S; Rač S

Drepana cultaria F. - jednotlivě, 3. 8. 1984 Dubí S

Cilix glaucata Scop. - hojný, lok. 1, 2, 8, 9, 20, 26, 28

Syssphingidae

Aglia tau L. - lokální a nehojný, Teplický vrch S, T; Dubice T; 1. 5. 1966 Lukov Dš

Saturniidae

Eudia pavonia L. - lokální, ale hojný, Dubice A, S, T, P

Lasiocampidae

Malacosoma neustria L. - nehojný, Bystřany D, S; Žalany T

Poecilocampa populi L. - pozdní, nehojný druh, Bystřany D, S; Teplice P

Lasiocampa quercus L. - v posledních letech nepotvrzený, VII. 1975-76 Cínovec, Dubí D, S

Pachygastris trifolii Schiff. - jednotlivě, Bystřany VII. 1964 Dš, 28. 8. 1974 D, larva VI. 1987 S

Macrothylacia rubi L. - lokální, ale hojný, Bystřany D, S, T

Gastropacha quercifolia L. - velmi jednotlivě, 30. 6. 1986 a 11. 7. 1987 Bystřany S; 26. 7. 1963 Bystřany Dš

Odonestis pruni L. - nehojný, Bystřany, Teplice, Kostomlaty D, S, P

Psychidae

Psyche viciella Schiff. - lokální, hojně na světlo, Rač D, S

Epichnopteryx pulla Esp. - na lokalitě Bystřany se již nevyskytuje, kdysi hojný, V. 1974 Bystřany D; 5. 5. 1990 Rač S

Fumea casta Pall. - nehojně, Bystřany D, S; Bohosudov D, S

Aegeriidae

Aegeria apiformis Cl. - nehojně, Bystřany D, S

Chamaesphexia empiformis Esp. - 20. 5. 1974 Bystřany D; Rač D, S

Cossidae

Cossus cossus L. - jednotlivě, Bystřany 6. 7. 1985 S a 14. 8. 1991 D; Bžany - Hradiště 6. 7. 1983 D

Zeuzera pyrina L. - rozšířený a hojný, lok. 1, 26, 28

Hepialidae

Hepialus humuli L. - hojný v celé oblasti

Hepialus fusconebulosus de Geer. - jednotlivě, Bystřany 11. 7. 1964 Dš; 15. 7. 1983 D; 6. 7. 1983 a 27. 6. 1990 S

Hepialus sylvina L. - v celé oblasti hojný, lok. 1, 26, 28

Hepialus lupulinus L. - jako předešlý druh

Noctuidae

Euxoa tritici L. - vzácně, 22. 7. 1991 D a 21. 7. 1990 S Bystřany

Euxoa nigricans L. - jednotlivě, Bystřany D, S

Euxoa aquilina Schiff. - hojně, Bystřany D, S

Scotia segetum Schiff. - hojný druh, lok. 1, 2, 8, 9, 20, 26, 28

Scotia exclamationis L. - velmi hojný druh, lok. 1, 2, 8, 9, 20, 26

Scotia ipsilon Hufn. - v celé oblasti hojný druh, lok. 1, 2, 8, 9, 20, 26, 28

Ochropleura praecox L. - jediný nález 23. 8. 1985 Bystřany S

Ochropleura plecta L. - velmi hojný druh, lok. 1, 2, 8, 9, 20, 26, 28

Rhyacia lucipeta Schiff. - jediný exemplář 21. 9. 1986 Bystřany S

Noctua pronuba L. - hojně, lok. 1, 2, 8, 9, 20, 26, 28

Noctua orbona Hufn. - velmi jednotlivě, 14. 9. 1991 Bystřany D

Noctua comes Hbn. - poměrně hojně, lok. 1, 2, 8, 9, 20, 26

Noctua fibriata Schreber. - hojně, lok. 1, 2, 8, 9, 20, 26

Noctua janthina Schiff. - nehojně, ale pravidelně, lok. 1, 2, 8, 9, 20, 26

Noctua interjecta Hbn. - dva exempláře, Bystřany 27. 7. 1990 D a 22. 7.

1989 S

Opigena polygona Schiff. - migrant, Bystřany D, S

Graphiphora augur F. - jednotlivě, 7. 7. 1985 a 11. 6. 1988 Bystřany D

Diarsia brunnea Schiff. - jediný údaj, Bystřany 16. 7. 1990 S

Diarsia rubi View. - poměrně hojně, lok. 1, 8, 9, 20, 26

Amathes c-nigrum L. - migrant, velmi hojně, lok. 1, 2, 8, 9, 20, 26, 28

Amathes ditrapezium Schiff. - nehojně, Bystřany D, S

Amathes rhomboidea Esp. - jednotlivě, Bystřany D, S

Amathes sexstrigata Haw. - poměrně hojně, Bystřany D, S; Rač D, S

Amathes xanthographa Schiff. - jednotlivě, Bystřany 23. 8. 1983 D a 24. 8.

1985 S

Phalaena typica L. - jednotlivě, VIII. 1985 Teplice S, 23. 6. 1984 D a 16. 7.

1990 S Bystřany

Anaplectoides prasina Schiff. - jediný údaj, Bystřany 25. 6. 1988 S

Cerastis rubricosa Schiff. - v celé oblasti hojný druh, lok. 1, 8, 9, 26

Cerastis leucographa Schiff. - jednotlivě, Bystřany 17. 4. 1988 D, 20. 4. 1985 a 26. 4. 1992 S

Dicestra trifolii Hufn. - hojný druh v celé oblasti, lok. 1, 2, 8, 9, 20, 26, 28

Polia bombycina Hufn. - nehojně, Bystřany D, S

Polia nebulosa Hufn. - jako předešlý druh

Pachetra sagittigera Hufn. - jednotlivě, Bystřany D, S

Sideridis albicolon Sepp - jediný údaj, Bystřany 26. 5. 1984 S

Heliophobus reticulata Goeze - jednotlivě, Bystřany D, S

Mamestra brassicae L. - velmi hojný druh, lok. 1, 2, 8, 9, 20, 26, 28
Mamestra persicariae L. - jako předešlý druh
Mamestra contigua Schiff. - jediný údaj, Bystřany 29. 6. 1985 D
Mamestra w-latinum Hufn. - hojně, Bystřany D, S
Mamestra thalassina Hufn. - nehojně, Bystřany D, S
Mamestra suasa Schiff. - jednotlivě, Bystřany 10. 9. 1984 a 22. 8. 1987 S, 28. 8. 1985 D
Mamestra splendens Hbn. - vzácný druh, jediné imago 19. 6. 1992 Bystřany S
Mamestra oleracea L. - jednotlivě, Bystřany 19. 6. 1987 S, 28. 6. 1985 D
Mamestra pisi L. - jednotlivě, 19. 6. 1992 Bystřany D, S
Mamestra glauca Hbn. - lokálně Cínovec A, S
Mamestra dysodea Schiff. - Bystřany 31. 7. 1986 D a 30. 5. 1992 S
Hadena rivularis F. - jednotlivě, Bystřany 26. 5. 1987 D a 16. 8. 1990 S
Hadena luteago Schiff. - Třebenice 10. 7. 1991 D a 18. 6. 1992 Bystřany D
Hadena compta Schiff. - nehojně, Bystřany D, S
Hadena bicruris Hufn. - jediný údaj, Bystřany 19. 9. 1985 S
Lasionycta proxima Hbn. - 1. 8. 1992 Bystřany D
Lasionycta nana Hufn. - jednotlivě, 9. 6. 1984 Komáří vížka D, S
Eriopygodes imbecilla F. - jediný údaj mimo region - 20. 6. 1992 Třebenice D
Cerapteryx graminis L. - nehojně, Bystřany D, S; Bohosudov S
Tholera cespitis Schiff. - nehojně, Rtyň S, D, P; Rač D, S
Tholera decimalis Poda - nehojně, Bystřany D, S; Rtyň S
Panolis flammea Schiff. - jednotlivě, Bystřany 26. 4. 1992 D, S
Xylomiges conspicillaris L. - hojná v celé oblasti
Orthosia cruda Schiff. - velmi hojná v celé oblasti
Orthosia miniosa Schiff. - jednotlivě, Bystřany D, S
Orthosia populi Ström. - 31. 3. 1989 a 17. 4. 1988 D, S Bystřany
Orthosia gracilis Schiff. - nehojně, Bystřany D, S
Orthosia stabilis Schiff. - hojná, lok. 1, 2, 8, 9, 20, 26, 28
Orthosia incerta Hufn. - velmi hojná, lok. 1, 2, 8, 9, 20, 26, 28
Orthosia munda Schiff. - poměrně hojný druh
Orthosia gothica L. - jako předešlé druhy
Mythimna conigera Schiff. - nehojně, Bystřany, Bohosudov, D, S
Mythimna ferrago F. - nehojně, Bystřany D, S
Mythimna albipuncta Schiff. - velmi hojná, lok. 1, 2, 8, 9, 20, 26, 28
Mythimna pudorina Schiff. - jednotlivě, Bystřany D, S
Mythimna impura Hbn. - jednotlivě, 3. 8. 1991 Bystřany D, 23. 7. 1991 Bohosudov D
Mythimna pallens L. - hojně, lok. 1, 2, 8, 9, 20, 26, 28
Mythimna sicula Tr. - jediná lokalita Rač 6. 6. 1991 D, S a 22. 6. 1991 D, S
Leucania comma L. - jednotlivě, Bystřany D, S
Amphipyra pyramidea L. - hojný druh, lok. 1, 2, 8, 9, 20, 26, 28
Amphipyra tragopogonis Cl. - jako předešlý druh
Mormo maura L. - jediný údaj, 4. 8. 1984 Bystřany D
Rusina ferruginea Esp. - jednotlivě, Bystřany D, S

Talpophila matura Hufn. - mimo region, Raná D, F, S
Euplexia lucipara L. - nehojně, Bystřany D, S
Phlogophora meticulosa L. - migrant, hojně
Phlogophora scita Hbn. - jediný údaj, Kostomlaty 27. 6. 1986 T
Ipimorpha retusa L. - jediný údaj, 12. 8. 1991 Bystřany D
Ipimorpha subtusa Schiff. - jednotlivě, Bystřany D, S
Enargia paleacea Esp. - jednotlivě, Bystřany D, S
Enargia ipsilon Schiff. - ojedinělý nález, 19. 6. 1992 Bystřany S
Cosmia trapezina L. - velmi hojný druh, lok. 1, 2, 8, 9, 20, 26, 28
Cosmia pyralina Schiff. - poměrně hojně, lok. 1, 26, 28
Hyppa rectilinea Esp. - ojediněle, 2. 7. 1987 Bystřany D
Actinotia polyodon Cl. - jednotlivě, Bystřany D, S
Apamea monoglypha Hufn. - hojná, lok. 1, 2, 8, 9, 20, 26, 28
Apamea lithoxylaea Schiff. - nehojně, Bystřany D, S
Apamea crenata Hufn. - jednotlivě, 6. 6. 1985 a 29. 6. 1985 Bystřany D, 27. 6. 1986 Kostomlaty S
Apamea lateritia Hufn. - jednotlivě, Bystřany D, Rač D, S
Apamea remissa Hbn. - jednotlivě, 13. 5. 1986 a 6. 6. 1987 Bystřany D, S
Apamea anceps Schiff. - jednotlivě, Bystřany D, S
Apamea sordens Hufn. - jednotlivě, Bystřany D, S
Apamea scolopacina Esp. - jediný nález z regionu 18. 6. 1992 Bystřany D
Apamea ophiogramma Esp. - jednotlivě, 24. 7. 1989 D, 25. 7. 1989 S, 12. 8. 1991 D, vše Bystřany
Oligia strigilis L. - hojná, lok. 1, 2, 8, 9, 20, 26, 28
Oligia fasciuncula Haw. - jednotlivě, Bystřany S, 10. 7. 1991 Třebenice D
Oligia furuncula Schiff. - hojný, dosti proměnlivý druh, lok. 1, 26
Mesapamea secalis L. - jednotlivě, Bystřany D, S
Photedes minima Haw. - ojediněle, 24. 7. 1989 Bystřany D
Photedes fluxa Hbn. - jednotlivě, Bystřany D, S
Luperina testacea Schiff. - hojná, lok. 1, 2, 8, 9, 20, 26, 28
Amphipoea oculatea L. - poměrně hojně v celé oblasti,
Amphipoea fucosa Frr. - jako předchozí druh
Hydraecia micacea Esp. - nehojně v celé oblasti
Hydraecia petasitis Dbl. - jediný údaj, 6. 9. 1991 Kostomlaty F
Gortyna flavago Schiff. - nehojně, Bystřany D, S
Calamia tridens Hufn. - jednotlivě, Bystřany S, F; Rač D, S
Celaena leucostigma Hbn. - jediný údaj, 16. 7. 1990 Bystřany S
Nonagria typhae Thnbg. - jednotlivě, 4. 9. 1984 Bystřany D, 28. 9. 1984 Bystřany S
Rhizodra lutosus Hbn. - nehojně, Bystřany D, S
Oria musculosa Hbn. - jediný údaj, 31. 7. 1986 Bystřany S
Meristis trigrammica Hufn. - jediný údaj, 10. 6. 1989 Bystřany S
Hoplodrina alsines Brahm. - jednotlivě, Bystřany 28.-29. 6. 1987 D, 20. 6. 1991 D, S
Hoplodrina blanda Schiff. - nehojně, Bystřany D, S

Hoplodrina ambigua Schiff.- poměrně hojně, Bystřany D, S
Atypha pulmonaris Esp. - jediný údaj, Bohosudov 23. 7. 1991 D
Caradrina morpheus Hufn. - nehojně, Bystřany D, S
Paradrina clavipalpis Scop.- jako předešlý druh
Cucullia absinthii L. - ojedinele, 23. a 24. 6. 1989 D a 20. 7. 1990 S, vše Bystřany
Cucullia fraudatrix Ev. - jednotlivě, Bystřany D, S
Cucullia chamomillae Schiff.- jednotlivě, 28. 4. 1990 S a 6. 6. 1985 D, vše Bystřany
Cucullia umbratica L. - hojně v celé oblasti, lok. 1, 2, 8, 9, 20, 26, 28
Cucullia verbasci L. - larva VII. 1984 Bystřany S
Calophasia lunula Hufn. - jednotlivě, Bystřany D, S
Brachionycha sphinx Hufn. - jako předchozí druh
Cleoceris viminalis F. - jediný údaj, 12. 7. 1991 Bystřany S
Lithophane furcifera Hufn.- Bystřany 15. 9. 1988 D a 13. 10. 1992 S
Xylena vetusta Hbn. - jediný údaj, V. 1984 Bystřany T
Allophytes oxyacanthae L. - jednotlivě, Bystřany D, S
Griposia convergens Schiff.- jednotlivě, 28. 9. 1986 a 26. 9. 1992 Bystřany S
Blepharita satura Schiff. - hojně v celé oblasti
Ammoconia caecimacula Schiff. - hojně v celé oblasti, lok. 1, 8, 9, 26
Eupsilia transversa Hufn. - jako předchozí druh
Conistra vaccinii L. - jednotlivě, Bystřany D, S
Conistra rubiginosa Scop. - hojný druh, lok. 1, 2, 8, 9, 20, 26, 28
Agrochola circellaris Hufn. - nehojně, ale pravidelně, Bystřany D, S
Agrochola macilenta Hbn. - jednotlivě, Bystřany D, S
Agrochola nitida Schiff. - jednotlivě, Bystřany D, S
Agrochola helvola L. - jako předchozí druh
Agrochola humilis Schiff. - jednotlivě, Bystřany D, S
Agrochola litura L. - hojně, lok. 1, 2, 8, 9, 20, 26
Agrochola lychnidis Schiff.- jednotlivě, Bystřany D, S
Agrochola lota Cl. - ojedinele, 7. 11. 1984 Bystřany S, 24. 10. 1989 Teplice S
Atethmia ambusta Schiff. - vzácný druh, jednotlivě, 22. a 24. 8. 1985 D, VIII. 1991 D, S, vše Bystřany
Cirrhia aurago Schiff. - nehojně, Bystřany D, S
Cirrhia togata Esp. - jako předešlý druh
Cirrhia icteritia Hufn. - poměrně hojně, lok. 1, 26, 28
Cirrhia ocellaris Bkh. - ojedinele, 4. 10. 1988 a 28. 9. 1990 Bystřany S
Cirrhia citrigo L. - ojedinele, Bystřany S
Chloridea viriplaca Hufn. - migrant, jednotlivě, Bystřany D, S
Pyrrhia umbra Hufn. - nehojně v celé oblasti
Panemeria tenebrata Scop. - ojediné údaje, 25. 5. 1965 Bystřany Dš, 5. 5. 1975 Bohosudov D
Axylia putris L. - velmi hojně v celé oblasti, lok. 1, 2, 6, 8, 9, 20, 26, 28
Euthales algae F. - jednotlivě, Bystřany D, S, F

- Bryoleuca raptricula* Schiff. - ojediněle, 27. 7. 1990 D, 25. 7. 1989 S, Bystřany
- Bryoleuca domestica* Hufn. - mimo studovanou oblast, Raná D
- Colocasia coryli* L. - jediný údaj, 31. 7. 1986 Bystřany D
- Diloba caeruleocephala* L. - nehojně, Bystřany D, S
- Subacronicta megacephala* Schiff. - nehojně, Bystřany D, S
- Acronicta aceris* L. - jednotlivě, Bystřany D, S
- Acronicta leporina* L. - rozšířený a hojný druh oblasti, lok. 1, 8, 9, 26, 28
- Apatele alni* L. - lokální druh, jednotlivě, 27. 6. 1986 Kostomlaty S, 14. 5. 1988 Bohosudov S, 28. 5. 1985 Teplice P a 23. 5. 1992 Bystřany D
- Apatele psi* L. - hojný druh, lok. 1, 2, 5, 6, 8, 9, 20, 26, 28
- Phaetra auricoma* Schiff. - velmi hojný druh v celé oblasti, lok. 1, 2, 5, 6, 8, 9, 20, 26, 28
- Phaetra rumicis* L. - jako předchozí druh
- Craniophora ligustri* Schiff. - jednotlivě, Bystřany D, S
- Jaspidia deceptoris* Scop. - nehojně, Bystřany, Rač, Štrbice D, S
- Jaspidia pygarga* Hufn. - 16. 5. 1990 Bystřany S a 23. 5. 1992 Rač D
- Eustrotia olivana* Schiff. - lokální a nehojný druh, Bystřany D, S
- Emmelia trabealis* Scop. - nehojně, Bystřany, Štrbice D, S, P
- Acontia luctuosa* Esp. - jednotlivě, Bystřany D, S
- Nycteola revayana* Scop. - jednotlivě, Bystřany D, S
- Earias chlorana* L. - ojediněle, Bystřany 27. 7. 1990, 13. 6. 1991 D a 5. 6. 1992 S
- Bena prasinana* L. - nehojně, Bystřany D, S; Bohosudov P
- Pseudoips bicolorana* Fuessl. - jednotlivě, Bystřany D, S
- Chrysaspidia festucae* L. - jednotlivě, Bystřany D, S
- Chrysaspidia putnami* Grote - poměrně hojný druh, velmi podobný předchozímu taxonu, vyskytující se o něco později, Bystřany D, S; Teplice P
- Autographa gamma* L. - migrant, hojný všude
- Autographa pulchrina* Haw. - hojný v celé oblasti
- Autographa bractea* Schiff. - ojedinělé nálezy, v oblasti je hojnější pouze v Krušných horách, Bystřany 6. 7. 1975 a 24. 7. 1989 D, Krupka S, D
- Macdunnoughia confusa* Steph. - hojně v celé oblasti
- Plusia chrysitis* L. - jako předešlý druh
- Abrostola triplasia* L. - jediný údaj z oblasti, Bystřany 24. 7. 1989 S a 18. 6. 1992 D
- Abrostola trigemina* Wernbg. - poměrně hojně, Bystřany, Rač, Teplice D, F, S, P
- Catocala nupta* L. - nehojně v celé oblasti
- Catocala elocata* Esp. - jediný údaj, již mimo region, Litoměřice 23. 9. 1974 D
- Callistege mi* Cl. - velmi hojný druh v celé oblasti
- Ectypa glyphica* L. - jako předchozí druh
- Scoliopteryx libatrix* L. - jednotlivě, Bystřany D, S
- Lygephila cracca* Schiff. - nehojně, Bystřany D, S
- Lygephila pastinum* Tr. - jako předchozí druh

Parascotia fuliginaria L. - jednotlivě, Bystřany D, S
Rivula sericealis Scop. - jednotlivě, 1.8.1992 Bystřany D
Zanclognatha tarsipennalis Tr. - ojedinele, Bystřany 24. 6.1989, 30.6.1990 S
a 19.6.1992 D
Zanclognatha grisealis Schiff. - ojedinele, 26. 6. 1989 Teplice P, 23.6.1991
Bystřany D
Trisateles emortualis Schiff. - 19. 7. 1992 Bystřany D
Hypena rostralis L. - jednotlivě, Bystřany, Teplice D, S, P
Hypena proboscidalis L. - hojný druh oblasti

Geometridae

Archiearis parthenias L. - nehojně, Teplice, Teplický vrch D, S, F, P, T
Archiearis notha Hbn. - jednotlivě, Teplice, Teplický
vrch D, S, T; Lysec S
Alsophila aescularia Schiff. - velmi hojně v celé oblasti
Odezia atrata L. - jednotlivě, Krupka 26. 6. 1979 P, Moldava 23. 7. 1991 F,
Bohosudov 22. 6. 1992 S a 4. 7.1992 F
Geometra papilionaria L. - jednotlivě, 7. 7. 1983 Bystřany S, 27. 6. 1986
Kostomlaty S, T; Dubí S
Euchloris smaragdaria F. - lokální, ale poměrně hojný druh, Bystřany D, S;
Bohosudov D, S, F
Thalera fimbrialis Scop. - jediný údaj z oblasti, 29. 7.1986 Rač S
Sterrha rufaria Hbn. - jediný údaj, Rač 10. 7. 1989 S
Sterrha ochrata Scop. - lokální druh, jednotlivě, Jedovina D
Sterrha biselata Hufn. - jednotlivě, 24.7.1989 Bystřany D
Sterrha inquinata Scop. - jediný údaj, 3.7.1991 Bystřany S
Sterrha dilutaria Hbn. - poměrně hojně, Bystřany D, S; Třebenice D
Sterrha dimidiata Hufn. - jednotlivě, Bystřany D, S
Sterrha subsericeata Haw. - jediný údaj, 22.7.1991 Bystřany S
Sterrha emarginata L. - jediný údaj, 23.7.1991 Bohosudov S
Sterrha aversata L. - velmi rozšířená a hojná, lok. 1, 2, 8, 9, 20, 26, 28
Sterrha inornata Haw. - jednotlivě, Bystřany D, S; 25. 8. 1990 Rač D
Sterrha deversaria H. - jednotlivě, Rač D, 22. 7. 1991 Bystřany D
Cyclophora albipunctata Hufn. - jednotlivě, Bystřany D, S
Cyclophora annulata Schulze - ojedinele, Bystřany 24. 7.1989 D
Cyclophora punctaria L. - nehojně, Bystřany D, S
Calothyranis griseata Petersen - hojná, lok. 1, 2, 6, 8, 9, 20, 26, 28
Scopula immorata L. - jednotlivě, 17.6. 1990 Opárno S, 23. 6. 1991 Rač D
Scopula nigropunctata Hufn. - jediný údaj, 10. 7. 1989 Rač S
Scopula ornata Scop. - jediný údaj, 17.6. 1990 Opárno S
Scopula rubiginata Hufn. - nehojně, Bystřany, Rač D, S
Scopula marginipunctata Goeze - nehojně, Bystřany D, S
Scopula incanata L. - jednotlivě, Bystřany D, S
Scopula immutata L. - jediný údaj, 24.7.1989 Bystřany D
Scopula ternata Schrk. - lokální druh, 23. 7. 1991 Nové Město D

Rhodosophia vibicaria Cl. - poměrně hojně, Bystřany D, S
Lythria purpuraria L. - jediný údaj, 24. 7. 1986 Jedovina P
Scotopteryx plumbaria F. - jediný údaj, 27. 6. 1990 Bystřany S
Scotopteryx chenopodiata L. - hojná, lok. 1-3, 5-9, 11, 12, 15, 20, 26-28
Scotopteryx bipunctaria Schiff. - nehojně, Bystřany S, D
Minoa murinata Scop. - hojná, lok. 1, 2, 8, 9, 20, 26, 28
Anaitis praeformata Hbn. - nehojně, Bohosudov D, S
Anaitis plagiata L. - velmi hojná, lok. 1-3, 5-9, 11, 12, 15, 20, 26-28
Nothocasis sertata Hbn. - jednotlivě, 28. 9. 1988 Teplický vrch S
Lobophora halterata Hufn. - nehojně, Bystřany D, S
Operophtera brumata L. - velmi hojná, lok. 1, 2, 8, 9, 20, 26, 28
Oporinia dilutata Schiff. - nehojně, Bystřany D, S; Bohosudov S
Triphosa dubitata L. - jednotlivě, Bystřany D, S
Calocalpe cervinalis Scop. - jediný nález, Bystřany 24. 4. 1992 S
Calocalpe undulata L. - jediný nález, Bystřany 1. 7. 1992 S
Philereme vetulata Schiff. - jednotlivě, Bystřany D, S
Philereme transversata Hufn. - jako předchozí taxon
Lygris prunata L. - poměrně hojně, Bystřany, Teplice, D, S, P
Lygris populata L. - jediný údaj, 16. 7. 1990 Bystřany S
Lygris mellinata F. - nehojně, Bystřany D, S
Lygris pyraliata Schiff. - nehojně, Bystřany D, S
Cidaria fulvata Forst. - nehojně, Bystřany, Radobýl D, S
Plemyria rubiginata Schiff. - jednotlivě, 16. 7. 1985 Kostomlaty P, 27. 7. 1990 Bystřany S
Thera variata Schiff. - nehojně, Bystřany S
Thera obeliscata Hbn. - jednotlivé nálezy, 27.5.1988 Bystřany S; 27.5.1989 Cínovec S
Dystroma truncata Hufn. - jednotlivě, Bystřany D, S
Dystroma citrata L. - nehojně, Bystřany D, S
Xanthorhoe fluctuata L. - velmi hojně, lok. 1-3, 8, 9, 20, 26, 28
Xanthorhoe montanata Schiff. - jednotlivě, Bystřany D, S; Kostomlaty S; Dubice S
Xanthorhoe spadicearia Schiff. - hojně, velmi rozšířený druh, lok. 1-3, 8, 9, 20, 26, 28
Xanthorhoe ferrugata L. - jednotlivě, Bystřany 12.5. 1985 D a 5. 8. 1990 S; 27. 5. 1989 Cínovec S
Ochyria quadrifasciata Cl. - jednotlivě, Bystřany D, S
Calostigia pectinataria Knoch - jednotlivě, Kostomlaty 16.7.1985 P a 10. 7. 1991 F; 12. 7.1991 Bystřany S
Lampropteryx suffumata Schiff. - jediný údaj z oblasti, 4.6.1985 Kostomlaty S
Coenoteophria berberata Schiff. - Bystřany 6. 8. 1984 D a 1. 8. 1992 S
Euphyia cuculata Hufn. - jednotlivě, Bystřany D, S
Euphyia luctuata Schiff. - nehojně, Bystřany D, S
Euphyia molluginata Hbn. - jediný údaj, Bystřany 22. 7.1991 S
Euphyia bilineata L. - nehojně, Bystřany D, S

Diactinia silaceata Schiff. - nehojně, Bystřany D, S; Krupka P
Electrophaes corylata Thnbg. - jednotlivě, 6. 6. 1985 a 3. 6. 1988 Bystřany S
Mesoleuca albicillata L. - 27. 6. 1986 Kostomlaty S a 19. 6. 1988 Bystřany D
Melanthia procellata Schiff. - jediný údaj, Bystřany 25. 5. 1988 S
Epirrhoe tristata L. - hojný druh v celé oblasti, lok. 1-3, 8, 9, 26
Epirrhoe alternata Müll. - jako předešlý druh
Perizoma alchemillata L. - nehojně, Bystřany D, S
Perizoma hydrata Tr. - jediný údaj, Bystřany 12. 5. 1990 S
Perizoma bifaciata Haw. - jediný údaj, Bystřany 18. 8. 1990 S
Perizoma blandiata Schiff. - rovněž jediný údaj, Bystřany 23. 7. 1991 S
Perizoma flavofasciata Thnbg. - nehojně, Bystřany D, S
Hydriomena furcata Thnbg. - jediný údaj, Bystřany 5. 7. 1989 S
Earophila badiata Schiff. - poměrně hojně, Bystřany, Rač u Habří
Pelurga comitata L. - poměrně hojně, lok. 1, 2, 26
Cataclysmes rigata Hbn. - nehojně a lokálně, Rač D, S
Hydrelia flammeolaria Hufn. - jednotlivě, Bystřany S
Euchoeca nebulata Scop. - Bystřany 27. 6. 1990 S a 18. 6. 1992 D
Asthena albulata Hufn. - jediný údaj, Bohosudov 2. 7. 1988 S
Eupithecia centaureata Schiff. - hojně ve dvou generacích, lok. 1, 2, 8, 9, 26
Eupithecia intricata Zett. - jednotlivě, Bystřany D, S
Eupithecia tripunctaria H. Sch. - jednotlivě, Bystřany 13. 5. 1986 D
Eupithecia linariata Schiff. - jednotlivě, Bystřany D, S
Eupithecia icterata Vill. - nehojně, Bystřany D, S
Eupithecia succenturiata L. - nehojně, Bystřany D, S
Chloroclystis v-ata Haw. - 23. 5. 1992 Rač D
Calliclystis rectangulata L. - jediný údaj, Bystřany 2. 7. 1987 D
Coenocalpe lapidata Hbn. - poměrně hojně, ale lokálně již mimo region, Lito-
měřice D
Horisme tersata Schiff. - jednotlivě, Bystřany 23. 6. 1991 D, 26 7. 1986 S
Calospilus sylvata Scop. - Teplice 26. 6. 1989 P a Bystřany 29 6. 1992 S
Lomaspilis marginata L. - hojně, lok. 1, 2, 8, 9, 20, 26, 28
Ligdia adustata Schiff. - nehojně, Bystřany, Rač D, S
Bapta temerata Schiff. - jako předešlý druh
Cabera pusaria L. - jednotlivě, Bystřany, Teplický vrch D, S
Cabera exanthemata Scop. - jednotlivě, Bystřany D
Plagodis dolabraria L. - nehojně, Bohosudov S, P; Teplice P a 26. 5. 1992
Bystřany S, D
Ellopija fasciaria L. - jediný údaj, Bystřany 18. 6. 1988 S
Campaea margaritata L. - poměrně hojně, Bystřany, Bohosudov D, S
Ennomos autumnaria Wrnbg. - hojný druh, lok. 1, 2, 26, 28
Ennomos quercinaria Hufn. - jednotlivě, Bystřany S
Deuteronomos alniaria L. - jednotlivě, Bystřany D
Deuteronomos fuscantaria Sph. - jednotlivě, Bystřany D, Kostomlaty 25. 8.
1984 S
Deuteronomos erosaria Hbn. - jednotlivě, Bystřany 12. 8. 1991 D

Selenia bilunaria Esp. - nehojně, Bystřany D, S
Selenia tetralunaria Hufn. - poměrně hojně, lok. 1, 2, 26, 28
Artioria evonymaria Schiff. - jediný údaj, Bystřany 16. 8. 1985 S
Gonodontis bidentata Cl. - jednotlivě, Bystřany a Kostomlaty D, S
Colotois pennaria L. - velmi hojný a rozšířený druh, lok. 1, 26, 28
Crocallis elinguaris L. - nehojně, Bystřany, Kostomlaty D, S
Ourapteryx sambucaria L. - velmi hojný a rozšířený druh, lok. 1, 2, 26, 28
Opisthograptis luteolata L. - velmi hojný a rozšířený druh
Epione repandaria Hufn. - jednotlivě, Kostomlaty D, S 14. 9. 1991
Pseudopanthera macularia L. - rozšířený a hojný druh, lok. 1-3, 5-9, 11, 12, 15, 20, 26-28
Macaria notata L. - jednotlivě, Bystřany D, S
Macaria alternaria Hbn. - poměrně hojně, lok. 1, 16
Macaria signaria Hbn. - jediný údaj, Bystřany 2. 7. 1987 D
Macaria liturata Cl. - jednotlivě, Bystřany D, S
Chiasma clathrata L. - velmi hojný a rozšířený druh, lok. 1-3, 5-9, 11, 12, 15, 20, 26-28
Itame wauaria L. - nehojně, Bystřany D, S
Itame fulvaria Vill. - Bystřany jednotlivě D, S, Nové Město - Moldava velmi hojně
Tephрина murinaria Schiff. - jediný údaj již mimo region, Raná u Loun 28. 7. 1991 S
Erannis leucophaearia Schiff. - hojná, lok. 1, 2, 26, 28
Erannis aurantiaria Hbn. - nehojně, Bystřany D, S
Erannis marginaria F. - jednotlivě, Bystřany D, S
Erannis defoliaria Cl. - velmi hojně, lok. 1, 26
Phigalia pedaria F. - časný a hojný druh, lok. 1, 26
Apocheima hispidaria Schiff. - jednotlivě, Bystřany D, S
Lycia hirtaria Cl. - jednotlivě, Bystřany D, S
Biston strataria Hufn. - nehojně, Bystřany D, S
Biston betularia L. - velmi hojně, převažuje f. carbonaria, lok. 1, 26
Peribatodes rhomboidaria Schiff. - nehojně, Bystřany D, S
Cleora cinctaria Schiff. - poměrně hojně, Bystřany D, S
Alcis repandata L. - hojně, Bystřany, Teplice D, S, P
Boarmia roboraria Schiff. - jednotlivě, Bystřany 17. 6. 1989 S
Ectropis bistortata Goeze - jednotlivě, Bystřany D, S
Ectropis extersaria Hbn. - jediný údaj, Bystřany 27. 5. 1988 S
Aethalura punctulata Schiff. - jednotlivě, Bystřany 17. 5. 1984 S a 13. 5. 1986 D
Gnophos fuvrata Schiff. - jediný údaj, již mimo region, Ústí nad Labem 23. 7. 1989 D
Gnophos obscurata Schiff. - jednotlivě, Bystřany 1. 8. 1989 a 18. 8. 1990 S
Catascia dilucidaria Schiff. - Nové Město - Moldava, hojně, D, S, P, F
Ematurga atomaria L. - hojný a rozšířený druh, lok. 1-3, 5-9, 11, 12, 20, 26-28

Bupalus piniaria L. - jednotlivě, Bystřany D, S
Selidosema brunnearia Vill. - jediný údaj, Rač u Habří 25. 8. 1990 S
Siona lineata Scop. - rozšířený a hojný druh, lok. 1-3, 5-9, 11, 12, 20, 26-28
Aspilates gilvaria Schiff. - jediný údaj, Rtyně - Kozlíky 10. 8. 1991 F

SOUHRN:

V této práci je uvedeno 541 druhů Lepidopter, z nichž 15 druhů se vyskytuje mimo okres Teplice. Na druhou stranu se pak 468 druhů prokázalo na lokalitě Bystřany, kde je prováděn nejintenzivnější a nejpravidelnější sběr. Přes dosažené výsledky je však jasné, že počet druhů zjištěných v této oblasti není zdaleka konečný.

SUMMARY:

In this paper 541 species of Lepidoptera are mentioned. Among this number 15 species occurred outside the Teplice district but 468 species were found in Bystřany location where the most intensive research was carried out. In spite of achieved results it is clear that the number of species is far from being final in this area.

LITERATURA

Forster W., Wohlfahrt A.T., 1955, Die Schmetterlinge Mitteleuropas, Band I - V;
Novák I., 1989, Seznam lokalit a jejich kódů pro síťové mapování entomofauny Československa, Zprávy ČSSE při ČSAV, 25, 3-84.

Adresy autorů:

Karel Duchek, Dreyerova 612, 152 00 Praha 5

Jiří Skoupý, Pražská 74, 417 61 Bystřany