Klapalekiana, **29**: 101-102, 1993
ISSN 1210-6100

Populace *Leichenum pictum* (Coleoptera: Tenebrionidae) u Čenkova (jihozápadní Slovensko)

A population of *Leichenum pictum* (Coleoptera: Tenebrionidae) from Čenkov (southwestern Slovakia)

Vladimír NOVÁK

Okresní muzeum Praha - východ, Masarykovo nám. 97,
CZ- 250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Faunistics, Coleoptera, Tenebrionidae, *Leichenum pictum*, Slovakia

Abstract. Thirty one specimens of *Leichenum pictum* (Fabricius, 1801) have been found on a forest sand dune on Dunaj river alluvions near Čenkov (square No. 8277 of faunistic map grid - see Zelený 1972) in 1987-1993. A small population which survives at this locality is not immediately endangered by construction of Gabčíkovo water barrier.

Pontomediterránní druh *Leichenum pictum* (Fabricius) proniká přes Pannonskou nížinu do Rakouska a na jižní Slovensko (Kaszab 1969, Picka 1978, Stebnicka 1991). Ze Slovenska jsou uváděny (Picka 1978) nálezy z lokalit Slovenské Nové Mesto, Štúrovo a Streda nad Bodrogom. Další nález uvádí Strejček (1988) z lokality Marcelová pr. Komárno. V Čechách a na Moravě nebyl tento druh doposud zjištěn (Picka 1993). Zde podávám zprávu o nálezech na další lokalitě na Slovensku.

Materiál: Slovakia mer.occ., Čenkov (8277), 1.6.1987, 7 ex., J. Vitner lgt., coll. Muzeum Praha-východ, Brandýs n.L.-Stará Boleslav; 5.6. 1988, 10.6. 1988, 4 a 1 ex., V. Novák lgt. et coll.; 5.- 6.6. 1988, 4 ex., J. Vitner lgt., 2 ex. in coll. V. Novák, 2 ex. in coll. Muzeum Praha-východ; 12.5. 1989, 11 ex., V. Novák lgt., 9 ex. in coll. V. Novák, 2 ex. in coll. J. Hrdlička; 29.5. 1993, 4 ex., 2 ex. V. Novák lgt. et coll., 2 ex. T. Růžička lgt. et coll.; vše V. Novák det. Druh byl nalezen při každé autorově návštěvě lokality.

Brouci byli sbíráni na písečném přesypu s několikaletým náletem borovic a řídkým porostem travin uvnitř smíšeného lesa. Lokalita leží cca 500 m východně od hranice rezervace Čenkovská lesostep a cca 500 m severně od břehu Dunaje v nadmořské výšce zhruba 110 m.

Z toho, že druh byl v rozmezí posledních sedmi let nalézán, byť pokaždé v nevelkém počtu exemplářů, pravidelně, lze vyvodit, že v Čenkově přežívá populace, jejíž existenci dosud bezprostředně neohrozily změny hydrologických poměrů způsobené pracemi na úpravě koryta Dunaje v souvislosti s výstavbou gabčíkovské přehrady.

LITERATURA

KASZAB Z. 1969: 83. Familie: Tenebrionidae, pp. 229-264. In: FREUDE H., HARDE H.W. & LOHSE G.A. (eds.): *Die Käfer Mitteleuropas 8. Teredilia, Heteromera, Lamellicornia.* Goecke & Evers, Krefeld, 388 pp.

PICKA J. 1978: Potemníkovití brouci Československa (Coleoptera, Tenebrionidae). *Zpr. Čs. Společ. Entomol. ČSAV, Klíče k určování hmyzu* 1: 3-53 (in Czech).

PICKA J. 1993: Tenebrionidae, pp. 117-118. In: JELÍNEK J. et al.: Check-list of Czechoslovak Insects IV (Coleoptera). Seznam československých brouků. *Fol. Heyrovskyana, Suppl.* 1: 3-172 (in English and Czech).

STEBNICKA Z. 1991: *Klucze do oznaczania owadów Polski. Cz. 19. Chrzaszcze - Coleoptera. Zesz.91. Czarnuchowate - Tenebrionidae, Boridae.* Pol. Towarz. Entomol., Wroclaw, 93 pp. (in Polish).

STREJČEK J. 1988: Zajímavé nálezy brouků ze skupin čeledí Heteromera a Clavicornia v ČSSR. (Die interessanten Funde der Käfer der Gruppen Heteromera und Clavicornia in der ČSSR.) *Zpr. Čs. Společ. Entomol. ČSAV*, 24: 65-66 (in Czech, German abstr.).

ZELENÝ J. 1972: Návrh členění Československa pro faunistický výzkum. (Entwurf einer Gliederung der Tschechoslowakei für Zwecke der faunistische Forschung. *Zpr. Čs. Společ. Entomol. ČSAV*, 8: 3-16 (in Czech, German abstr.).

RECENZE

KUBISZ D. 1992: Zalescztycowate - Oedemeridae. Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XIX. Zeszyt 85. Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Wroclaw, 52 pp.

V dalším díle série Klucze do oznaczania owadów Polski zpracoval Mgr. Daniel Kubisz čeleď brouků stehnáčovitých (Oedemeridae). Jedná se o nejmodernější zpracování čeledi v rámci středoevropského regionu, včetně využití nejnovějších publikovaných údajů. Práce obsahuje kapitoly: Úvod, Morfologie imag, Morfologie larev a kukel, Rozšíření, Bionomie a hospodářský význam, Metody sběru a preparace, Systematický přehled, Klíče larev a imag, Literatura a Rejstřík latinských názvů. Klíč je doprovázen velmi zdařilými ilustracemi. Nedostatky díla jsou jen nepatrné. Jedná se o nekritické převzetí údajů o výskytu druhů *Ischnomera sanguinicollis* (F.) a *I. cinerascens* (Pand.) na Kavkaze. Rozdíly v nomenklatuře oproti Check-list of Czechoslovak Insects jsou: *Chrysanthia geniculata* Heyd. = *Ch. nigricornis* Westh. a *Anogcodes seladonia austriaca* (Gglb.) = A. *dispar azurea* Schm. Správnou nomenklaturu těchto druhů bude nutno řešit na základě revize typového materiálu, popřípadě originálních popisů. Oproti naší fauně není uveden druh *Nacerdes (Xanthochroa) carniolica carniolica* (Gistl), který je snadno odlišitelný od *N. (s.str.) melanura* (L.) podle velkých očí. Publikace je po odborné stránce velmi dobře zpracovaná, včetně velmi kvalitních ilustrací, a je s výjimkou výše uvedeného druhu plně použitelná pro naše území.

Vladimír Švihla

Recenzovanou publikaci je možno zakoupit u firmy Kabourek, Sokolská 3923, 760 01 Zlín