

ZPRÁVA O VÝSKYTU PERLETOVCE MOKŘADNÍHO (CLOSSIANA APHIRAPE /HBN./)
NA ŠUMAVĚ (RHOPALOCERA, NYMPHALIDAE)

Dalibor Weiss

Problém výskytu Clossiana aphirape (Hbn.) v ČSSR je mezi našimi lepidopterology po léta předmětem diskuse. Dokladových exemplářů od nás bylo málo a jejich původ byl vesměs pochybný.

V roce 1963 chytil údajně J.Ebenhöh v oblasti státní přírodní rezervace Mrtvý luh u Dobré na Šumavě jednoho jedince.

Loňského roku jsem měl možnost tento exemplář vidět. Jde o čerstvě vylíhlého samce Clossiana aphirape aphirape (Hbn.), který byl na uvedené lokalitě chycen 14.června 1963. Abych se přesvědčil, že nejde o zalétlý kus z Rakouska, podnikl jsem 18.června 1966 týdenní exkursi do míst původního nálezu, tj. do rezervace Mrtvý luh a do celého povodí Studené a Teplé Vltavy. Výskyt druhu Cl.aphirape (Hbn.) jsem v této oblasti potvrdil.

Motýl tam létá na rašeliništích a bažinatých lukách místy velmi hojně a je dispergován v celém povodí Studené a Teplé Vltavy, zejména v inundačním pásnu, kde roste rdesno hadí kořen (Polygonum bistorta L.), jež je živnou rostlinou jeho housenky. Ohnisko výskytu Cl.aphirape Hbn. je při soutoku Studené a Teplé Vltavy v rezervaci Mrtvý luh i mimo ni v nadmořské výšce 730 m.

Spolu s Cl.aphirape (Hbn.) jsem na lokalitě zastihl tyto druhy denních motýlů:

Colias palaeno (L.), Erebia medusa (Den.et Schiff.), Coenonympha tullia (Müller), Coenonympha iphis (Den.et Schiff.), Melitaea athalia (Rott.), Melitaea dictynna (Esp.) = diamina (Lang), Boloria aquilonaris (Stich.), Clossiana selene (Den.et Schiff.), Brenthis ino (Rott.), Vacciniis optilete (Knoch), Cyaniris semiargus (Rott.), Lycaena hippothoe (L.).

Nálezem je dokázáno, že druh Clossiana aphirape (Hbn.) lze považovat za příslušníka fauny ČSSR. Nasbíraný materiál v mé sbírce.

Pozn.redakce: Pro Slovensko uvádí tohoto motýla s pochybami K.Hrubý ve svém Prodrumu Lepidopter Slovenska pod jménem Pro-clossiana eunomia (Esp.).

VORKOMMEN DES PERLMUTTERFALTERS CLOSSIANA APHIRAPE (HBN.)
IM BÖHMERWALD (RHOPALOCERA, NYMPHALIDAE)

Das Vorkommen der Art in der Tschechoslowakei war bisher zweifelhaft. Sie wurde neulich von J.Ebenhöh im Naturschutzgebiet bei Dobrá im Böhmerwald in einem Stück am 14.6.1963 gesammelt. Vom Autor des Beitrages wurde später (18.6.1966) dort selbst das Vorkommen mehrfach bestätigt und somit festgestellt, dass die Art der Subspezies Cl.a.aphirape (Hbn.) angehört und dass es sich beim ersten Funde nicht um ein eingewandertes Stück handelte.

FRAGMENTA OPILIONIDOLOGICA II (ARACHN., OPILIONIDEA)

Vladimír Š i l h a v ý

V této krátké zprávě uvádím nálezy některých druhů sekáčů (Opilionidea) v Československu, o jejichž výskytu na našem území nemáme dosud mnoho údajů. Zároveň jsou na tomto místě poprvé v československé literatuře uvedena synonyma, zjištěná na podkladě novějších rozborů popisů některých druhů.

Ischyropsalis helwigi (Panzer) je podle podrobných studií Martensových starším synonymem druhu Ischyropsalis taunica Müller, stejně jako je platným jménem I. manicata L.Koch. I. decica Roewer je mladším synonymem tohoto druhu. Druh v novější literatuře citovaný jako "I. helwigi (Panzer)", vyznačující se dlouhými chelicerami, je ve skutečnosti I. muelneri Hamann, 1898. Na území naší republiky žijí tedy pravděpodobně jenom dva druhy rodu Ischyropsalis: v českých zemích I. helwigi, na Slovensku I. manicata. Mládě, které jsem našel v r.1949 v okolí Třebíče, patří podle srovnání s materiálem z Německa skutečně druhu I. helwigi. Kromě tohoto nálezu jsem našel ještě u Mariánských Lázní v údolí před přehradou nad Lunsparkem 28.8.1961 ve smrkovém lese mezi kořany vyvráceného stromu 1 ♀ tohoto druhu.

Trogulus tricarinatus (Linné). Jednoho samečka jsem našel 22.4.1957 v hromádce kamení na okraji pole blízko vrcholku kopce Kozákova u Turnova, jednu samičku 3.7.1961 na zahradě samo-