Klapalekiana, **29**: 169-171, 1993
ISSN 1210-6100

# FAUNISTIC RECORDS FROM THE CZECH REPUBLIC - 9

Die Bemerkung: Die Arten mit dem Zeichen "+" vor dem Namen wurden zwar von mir im neuen Verzeichnis, Check-List (Jelínek et al. 1993) angegeben, jedoch ohne nähere Angaben; NSG = Naturschutzgebiet.

## Coleoptera:

### Chrysomelidae

+ ***Zeugophora frontalis*** Suffrian, 1840 (= sp. pr., nicht nur Abberation von *Z. scutellaris* Suffrian, 1840). Bohemia centr.: Polabí: Velký Osek (5957a), 1. vi. 1902, 1 ♀, leg. ?, det. und coll. Strejček. Verbreitung: Polen. Neue Art für die Tschechische Republik.

+ ***Oulema duftschmidi*** (Redtenbacher, 1874). Bohemia centr. - zum Beispiel: Praha-Pitkovice (5953c), die Wiese in dem Bachtal, 12. x. 1991, 1 ♂; Praha - Radotínské údolí (6051b, NSG), in dem Laubwald, 1. vii. 1991, 1 ♂, 1 ♀; Praha - Klánovický les: Štamberk-jih (5954a, NSG), in nassem Laubwald, 5. v. 1991, 1 ♂, 19. vi. 1991, 1 ♂; Praha-Zadní Kopanina: Zmrzlík (5951d, NSG), die Waldsteppe und xerotherme Heide, 1. vii. 1991, 2 ♂♂; Praha-Zbraslav: Zbraslavská tůň (6052a, NSG), auf dem Tümpelufer, 10. vi. 1991, 1 ♂; der Berg Malý Blaník (6355c), cca 600 M, in dem Laubschuttwald, 6. vii. 1991, 1 ♂; Světlá bei Louňovice pod Blaníkem (6355a), auf nasser Wiese im Blanice - Tal, 6. vii. 1991, 1 ♂; Bohemia occ. - zum Beispiel: Michalovy Hory bei Chodová Planá (6042d), auf xerothermem Waldrand, 9. v. 1991, 1 ♂; Bochov bei Karlovy Vary (5844c), auf einem Teichufer, 19. iv. 1992 in Sieb, 1 ♂; Bohemia mer. - zum Beispiel: Chlum u Třeboně (7055b), die Sandbank beim Teich, 23. v. 1992, 1 ♂; das Gebirge Novohradské hory, das Tal "Terčino údolí" bei Nové Hrady (7254a), in der Uferzone des Baches, 5. ix. 1992, 1 ♂; alles leg., coll. et det. Strejček. Wie von diesen Angaben hervorgeht, kommt diese Art nicht selten auf sehr verschiedenen Biotopen, oft zusammen mit der sehr ähnlichen *O. melanopus* (Linnaeus, 1758); beide Arten sind nur nach der Untersuchung des Innensacks von Aedeagus oder der Spermatheka sicher zu unterscheiden - die Art wird bestimmt auf ganzem Gebiet der Tschechischen Republik festgestellt werden. Die bisherige Verbreitung: Österreich, Deutschland, Frankreich. Neue Art für die Tschechische Republik.

+ ***Phyllotreta austriaca*** Heikertinger, 1909. Bohemia centr.: der Berg Malý Blaník (6355c), cca 500 M, der Buchenwald (Fagetum), 15. vi. 1991, 1 ♂, leg. E. Strejčková, det. und coll. Strejček. Verbreitung: Mähren, Österreich, Ukraine, Ungarn, Sibirien. Die neue Art für Böhmen.

+ ***Phyllotreta astrachanica*** Lopatin, 1977. Diese Art war neu von ähnlicher *P. diademata* (Foudras, 1859) unterschieden; die zuverlässige Bestimmung beider Arten ist nur durch Studium der Aedeagus-Form möglich. Alle von mir revidierten und bestimmten Exemplare gehören nur der Art *P. astrachanica*; die Art wurde auf verschiedenen Biotopen gesammelt, zum Beispiel: Bohemia centr.: Praha - Radotínské údolí (6051b, NSG), auf der Felsensteppe auf Kalk, 20. v. 1991, 1 ♂; Praha-Královice (5953d), auf einer Wiese im Bachtal, 6. v. 1992, 1 ♂; Praha - Císařský ostrov (5852c), auf dem Ufer des Flusses Vltava, 11. viii. 1992, 1 ♂. Alles leg., det. und coll. Strejček. Verbreitung: Russland (Astrachan), Polen, Ungarn, Bulgarien. Neue Art für die Tschechische Republik.

+ ***Longitarsus noricus*** Leonardi, 1976. Diese Art wurde neu von der ähnlichen und gemeinen Art *L. succineus* (Foudras, 1859) unterschieden; auch bei dieser Art ist die sichere Bestimmung nur durch Untersuchung der Form der Genitalien möglich. Bohemia centr.: Praha-Komořany (6052a), auf einer Wiese beim Fluss Vltava, auf *Artemisia vulgaris*, 26. vi. 1991, 1 ♂; Praha-Zadní Kopanina: Zmrzlík (5951d, NSG), auf xerothermer Heide, 1. vii. 1991, 1 ♂, 1 ♀; alles leg., det. und coll. Strejček.

Verbreitung: Italien, Österreich, Deutschland, Polen, Ukraine, Russland, Slowakei, Ungarn, Rumänien, ehemaliges Jugoslawien, Bulgarien. Neue Art für die Tschechische Republik.

***Longitarsus pinguis*** Weise, 1888. Bohemia centr.: Albertovy skály (6252a, NSG) bei Nalžovice neben Sedlčany, im schattigen Laubwald auf niedriger Vegetation (wahrscheinlich auf *Pulmonaria* sp.), 25. ix. 1993, 1 ♂, 2 ♀♀, leg., det. und coll. Strejček. Verbreitung: Slowakei, südöstliche Europa, südliche und östliche Voralpen, Polen (Pieniny Geb.). Neue Art für die Tschechische Republik.

***Altica carinthiaca*** Weise, 1888. Moravia mer.: Bulhary bei Lednice (7166a), Quercetum, 20. vii. 1985, 3 ♂♂, 2 ♀♀; leg., coll. und det. Strejček. Verbreitung: Skandinavien, südliche und östliche Voralpen, Bosnien, Mittel-Italien, Frankreich, Niederlande, Deutschland (Hamburg), Mittelasien. Neue Art für Tschechische Republik.

+ ***Minota halmae*** (Apfelbeck, 1906). Von ähnlicher *M. obesa* (Waltl, 1839) und *M. carpathica* Heikertinger, 1911 nur durch Untersuchung der Aedeagus-Form zu bestimmen. Moravia sept. (Silesia): Beskydy-Gebirge: Berg Radhošť (6575a, NSG), cca 1 000 M, unter dem Gipfel, gesiebt im Bergwald (Fageto-Picetum), 23. vii. 1988, 1 ♂, leg., coll. und det. Strejček. Verbreitung: Slowakei, Bulgarien, Rumänien, Slawonien, Bosnien, Kroatien, Istrien, Österreich, Italien. Neue Art für die Tschechische Republik.

**Bruchidae**

+ ***Acanthoscelides pallidipennis*** (Motschulsky, 1874). Moravia mer.: Pavlovské kopce (7165b, NSG), 27. ix. 1992, 1♂, 3♀♀, leg. Schneider, coll. und det. Strejček. Verbreitung: Eine nordamerikanische Art, die sich ursprünglich in Früchten vom nordamerikanischen Strauch *Amorpha fruticosa* entwickelt; der Strauch wächst auch in unseren Parkanlagen; in Europa: ehemaliges Jugoslawien, Bulgarien, Ungarn, Slowakei. Neue Art für die Tschechische Republik.

**Curculionidae**

+ ***Apion fallens*** Marseul, 1888. Moravia mer.: Sedlec u Mikulova, der Teich Nesyt (7266a), die Salzstelle (NSG), auf *Lotus tenuifolius*, 8. vii. 1977, 2 ♀♀; Dobré Pole bei Mikulov (7164c), die Salzstelle (der Rand eines Fussballspielplatzes), auf *Lotus tenuifolius*, 18. vii. 1988, 4 ♀♀; alles leg., coll. und det. Strejček. Verbreitung: Frankreich, Korsika, Italien, Schweiz, Österreich, Slowakei (Kamenín), Ungarn, ehemaliges Jugoslawien, Griechenland, Rumänien, West-Kaukasus. Neue Art für die Tschechische Republik.

+ ***Otiorhynchus crataegi*** Germar, 1824. Bohemia centr.: Praha-Záběhlice, die Siedlung Práče (5953a), auf *Ligustrum vulgare* und *Symphoricarpos rivularis*, 26. vi. 1992, 23. viii. 1993, nur in der Nacht, massenhaft, frisst die Blätter (auffälliger halbkreisförmiger Randfrass); leg., coll. und det. Strejček. Verbreitung: Italien, ehemaliges Jugoslawien, Rumänien, Österreich, Deutschland (Oberbayern). Neue Art für die Tschechische Republik.

***Polydrusus inustus*** Germar, 1824. Bohemia centr.: Nová Ves und Vepřek bei Veltrusy (5651d), auf dem Gebüsch, 26. vi. 1993, 10 ♀♀; 18. vii. 1993, 3 ♀♀; leg., coll. und det. Strejček. Verbreitung: Pontische Art, in rascher Ausdehnung nach Westen und Norden; Polen, Deutschland (Berlin), Süd-Frankreich. Neue Art für die Tschechische Republik.

+ ***Dorytomus nordenskioeldi*** Faust, 1882. Bohemia mer.: Šumava (= Böhmerwald) Gebirge: Městiště (6745c), 700 M, x. 1989, 1 ♀, J. Růžička leg., coll. und det. Strejček. Verbreitung: Von Ost-Asien über Sibirien bis nach Europa; bei uns in Nord-Mähren. Lebt auf *Populus tremula*. Neue Art für Böhmen.

***Aphytobius sphaerion*** (Boheman, 1845). Bohemia centr.: Dušníky bei Veltrusy (5751b), von den Standen an dem Vltava-Regulations- damm abgeklopft, 30. vii. 1993, 1 Ex.; an einem Schutzdamm im durchgesiebten Detrittus unter *Silene inflata* und *Melandryum album*, 4. viii. 1993, 1 Ex. Alles leg., det. und coll. Strejček. Von Böhmen zum letzten Mal von Lokay (1869), von Deutschland sind

die letzten Funde aus der Jahrhundertwende bekannt (Dieckmann 1972). Eine Wiederfeststellung des Vorkommens in Böhmen.

***Coeliodes proximus*** Schultze, 1895. Bohemia centr.: Průhonice u Prahy (6053a), in dem Schlosspark auf *Quercus* sp., 22. iv. 1993, 3 ♀♀; Moravia mer.: Pálava (NSG): Milovice - Umg. (7166a), auf *Quercus pubescens*, 22. iv. 1973, 1 ♀; alles leg., coll. und det. Strejček. Verbreitung: Aus Südost-Europa in Mittel-Europa eindringend; Ungarn, Österreich (Burgenland), Slowakei. Neue Art für die Tschechische Republik.

DIECKMANN L. 1972: *Beitr. Entomol.*, 22: 3-128. - JELÍNEK J. et al. 1993: *Fol. Heyrovskyana*, Suppl. 1: 3-172. - LOKAY E. 1869: *Arch. Naturwiss. Landesforsch.*, 1 (1868), sect. 4: 1-77.

Autor uvádí jako nové druhy pro faunu České republiky: čeleď Chrysomelidae: *Zeugophora frontalis* Suffr., *Oulema duftschmidi* (Redt.), *Phyllotreta astrachanica* Lop., *Longitarsus noricus* Leonardi, *L. pinguis* Wse., *Altica carinthiaca* Wse., *Minota halmae* (Apfelb.); čeleď Bruchidae: *Acanthoscelides pallidipennis* (Motsch.); čeleď Curculionidae: *Apion fallens* Mars., *Otiorhynchus crataegi* Germ., *Polydrusus inustus* Germ., *Coeliodes proximus* Schtze. Jako nové druhy pro faunu Čech uvádí: čeleď Chrysomelidae: *Phyllotreta austriaca* Heikertg.; čeleď Curculionidae: *Dorytomus nordenskioeldi* Faust. Je uveden první doložený nález *Aphytobius sphaerion* (Boh.) z Čech.

Jaromír STREJČEK, Mládežnická 3,
CZ-106 00 Praha 10, Tschechische Republik

Klapalekiana, *29*: 171, 1993
ISSN 1210-6100

## FAUNISTIC RECORDS FROM THE CZECH REPUBLIC - 10

### Hymenoptera: Bethyloidea: Bethylidae

***Cephalonomia carinata*** Kieffer, 1907. Bohemia centr.: Praha-Záběhlice (5953a), synanthrop, als Parasitoid von *Oryzaephilus surinamensis* (Linnaeus, 1758) (Coleoptera: Silvanidae), 15.ix. 1 ♀, 7.x. 1 ♀, 28.x. 5♂♂ 7♀♀, 20.xi.1991 2♀♀; 10.x.1992, 1♂. Alles leg., det. und coll. Strejček. Bisher bekannte Verbreitung: Albanien. Neue Art für die Tschechische Republik.

Jaromír STREJČEK, Mládežnická 3,
CZ-106 00 Praha 10, Tschechische Republik