

VORKOMMEN DES PERLMUTTERFALTERS CLOSSIANA APHIRAPE (HBN.)
IM BÖHMERWALD (RHOPALOCERA, NYMPHALIDAE)

Das Vorkommen der Art in der Tschechoslowakei war bisher zweifelhaft. Sie wurde neulich von J.Ebenhöh im Naturschutzgebiet bei Dobrá im Böhmerwald in einem Stück am 14.6.1963 gesammelt. Vom Autor des Beitrages wurde später (18.6.1966) dort selbst das Vorkommen mehrfach bestätigt und somit festgestellt, dass die Art der Subspezies Cl.a.aphirape (Hbn.) angehört und dass es sich beim ersten Funde nicht um ein eingewandertes Stück handelte.

FRAGMENTA OPILIONIDOLOGICA II (ARACHN., OPILIONIDEA)

Vladimír Š i l h a v ý

V této krátké zprávě uvádím nálezy některých druhů sekáčů (Opilionidea) v Československu, o jejichž výskytu na našem území nemáme dosud mnoho údajů. Zároveň jsou na tomto místě poprvé v československé literatuře uvedena synonyma, zjištěná na podkladě novějších rozborů popisů některých druhů.

Ischyropsalis helwigi (Panzer) je podle podrobných studií Martensových starším synonymem druhu Ischyropsalis taunica Müller, stejně jako je platným jménem I. manicata L.Koch. I. decica Roewer je mladším synonymem tohoto druhu. Druh v novější literatuře citovaný jako "I. helwigi (Panzer)", vyznačující se dlouhými chelicerami, je ve skutečnosti I. muelneri Hamann, 1898. Na území naší republiky žijí tedy pravděpodobně jenom dva druhy rodu Ischyropsalis: v českých zemích I. helwigi, na Slovensku I. manicata. Mládě, které jsem našel v r.1949 v okolí Třebíče, patří podle srovnání s materiálem z Německa skutečně druhu I. helwigi. Kromě tohoto nálezu jsem našel ještě u Mariánských Lázní v údolí před přehradou nad Lunsparkem 28.8.1961 ve smrkovém lese mezi kořany vyvráceného stromu 1 ♀ tohoto druhu.

Trogulus tricarinatus (Linné). Jednoho samečka jsem našel 22.4.1957 v hromádce kamení na okraji pole blízko vrcholku kopce Kozákova u Turnova, jednu samičku 3.7.1961 na zahradě samo-

ty u Starče (okres Třebíč) pod úlomkem starého dřeva.

Dicranolasma scabrum (Herbst). Slov.: Zádiel u Turny, 18.7.1958; Gombasek u Rožnavy, 21.7.1960; kopec Sitno u Banské Štiavnice, 25.6.1961; Bojnice, 21.6.1964, vše V.Šilhavý leg. - Hrad Muráň, fagetum, 17.5.1964, J.Buchar leg. Druh D.opilionoides (L.Koch), jehož nález oznámil kdysi Kolosváry na Slovensku (Sklenné Teplice), je také podle rozboru Martensova pouze mladším synonymem druhu D. scabrum.

Lugubrostoma triste (C.L.Koch). Druh nalezený na našem území pouze ve vyšších polohách západních Čech. Mariánské Lázně, údolí potoka pod přehradou nad Luneparkem, 28.8.1961, V.Šilhavý leg.

Nemastoma quadripunctatum (Perty). Hřensko, v lese pod Pravčickou bránou, 15.7.1966, V.Šilhavý leg.

Astrobus laevipes (Canestrini). Druh, o němž prokázal Gruber, že je starším a tedy platným synonymem druhu "Astrobus meadi". V poměrně velkém množství na Žitném ostrově (Zátoň u Dunajské Stredy, 20.7.1955, a 1 ♂ na hoře Řípu, pod vrcholem, 7.10.1961, oba nálezy V.Šilhavý.

Gyas annulatus (Olivier). 10.9.1954 jsem našel jedno mládě v lese u Špindlerova mlýna v Krkonoších.

Opilio dinaricus Šilh. Prvý nález tohoto druhu na území Československa je od P.Lauterera, 23.-28.6.1956, Vihorlat, fagetum v okolí Morského oka.

Leiobunum rupestre (Herbst). Mariánské Lázně, 28.8.1961, na mostě v údolí pod přehradou nad Luneparkem; Dobročský prales, 26.6.1961; Nový Bor, Klůčky, 14.7.1966; Hřensko, Pravčická brána, v tunelu cesty pod hotelem, 15.7.1966, vše Šilhavý leg.

FRAGMENTA OPILIONIDOLOGICA II (ARACHN., OPILIONIDEA)

In dieser Nachricht werden neuere Fundorte einiger Weberknechte aus der ČSSR angegeben.