

K ROZŠÍŘENÍ HÁLEK V POLSKU

Eduard B a u d y š

V roce 1954 (27.7.-8.8.) meškal prof.dr.Augustin Kalandra v okolí Miedziszdroje (lázně na Baltu východně od Štětína) a dr.F.J.Turček v září v r.1965 v okolí Mazur a Varšavy. Sebraný materiál hálek mi laskavě předali k zpracování. Určené sběry jsem odevzdal do sbírek botanického oddělení Moravského muzea v Brně. Háčky jsou seřazeny podle práce Buhrovy (1964-1965). Zkratky: K.=Aug.Kalandra, T.=J.F.Turček.

A s c o m y c e t e s (houby vřeckaté)

Protomyces macrosporus Ung. na Aegopodium podagraria L., Ruczana (Pisz) v Mazurech (T.)

A c a r i n a (roztoci)

Aceria platanoides (Nal.) na Acer platanoides L. (K.)

Eriophyes inangulis (Nal.) na Alnus glutinosa Gaertn. v Puszcze Kampinoskiej 15.9.1965 u Varšavy (T.) a Elblagu v Mazurech (7.9.1965, T.)

Eryophyes similis similis (Nal.) na Prunus spinosa L. (K.)

Eryophyes piri piri (Pag.) na Pyrus communis L. (K.)

Eryophyes piri pinaster Hegi (K.)

Phyllocoptes populi Nal. na Populus tremula L. var.villosa Long. (K.)

Aceria tetanothrix laevis (Nal.) na Salix aurita L. v Puszcze Kampinoskiej u Varšavy (T.)

Eriophyeson (Buhr 6048) na Salix caprea L. společně s bejlomorkou Teomyia major (Kieff.). Jehnědy jsou nápadně ztlustlé. Uvnitř hálek jsou četné kulaté komůrky velikosti hrachového zrna s trusem.

Phyllocoptes spec. na Sorbus aucuparia L. (K.). Listy zkrabatělé, místy na rub vypouklé, mramorovaně žluté jako při virose, ale poseté roztoči.

Eriophyes tiliae tiliae Pag. na Tilia intermedia DC. (K.)

Eriophyes leiosoma (Nal.) na Tilia cordata Mill. a Tilia intermedia DC. (K.)

Aceria ulmica brevipunctata (Nal.) na Ulmus montana Stokes (K.)

H o m o p t e r a (stejnokřídlí, mšice)

Phyllaphis fagi L. na Fagus silvatica L. (K.)

Sacchiphantes abietis (L.) na Picea excelsa Link. (K.)
Dysephs sorbi Kalt. na Sorbus aucuparia L. (K.)
Byrsocrypta ulmi L. na Ulmus carpinifolia Gled. v Puzsce Kampinoskiej u Varšavy (T.), na Ulmus montana Stokes. (K.)
Colopha compressa (Koch.) na Ulmus effusa Willd. (K.)
Aphis viburni Scop. na Viburnum opulus L. (K.)
Psyllopsis fraxini (L.) na Fraxinus excelsior L. (K.)

H y m e n o p t e r a (blanokřídli), čeleď Tentredinidae (pilatky)

Pontania viminalis L. na Salix purpurea L. v. typica Döll.f. gracilis Wim. Jastarnica na poloostrově Hel. (T.)
Pontania bridgmanii (Cam.) na Salix caprea L. (K.)
Phyllocolpa leucostictica (Htg.) na Salix aurita L. v Puzsce Kampionovskiej u Varšavy. (T.).

H y m e n o p t e r a (blanokřídli), čeleď Cynipidae (žlabatky)

Biorhiza pallida (Oliv.) ♂ na Quercus robur L.: Ruczana (Fisz) v Mazurech. (T.).

Andricus testaceipes Htg. ♂ na Quercus robur L. v Puzsce Kampinoskiej u Varšavy. (T.).

Andricus ostrea (Htg.) ♀♀ na Quercus robur L., Elblag v Mazurech (T.). V Puzsce Kampinoskiej u Varšavy. (T.)

Cynips quercifolii L. ♀♀ na Quercus robur L., Ruczana (Fisz) a Elblag v Mazurech (T.). V Puzsce Kampinoskiej u Varšavy. (T.)

Neuroterus laeviusculus Schenck. ♂♂ (N. albipes Schenck.) a ♀♀ na Quercus robur L. v Puzsce Kampinoskiej u Varšavy. (T.)

Cynips divisa Htg. ♀♀ na Quercus robur L.: s předešlou.

Neuroterus quercusbaccarum (L.) ♂♂ na Quercus petraea Liebl. (K.)

Neuroterus lenticularis Oliv. na Quercus robur L. v Puzsce Kampinoskiej u Varšavy. (T.)

Neuroterus fumipennis Htg. ♀♀ na Quercus robur s předešlým druhem.

L e p i d o p t e r a (motýli)

Petrova resinella (L.) na Pinus silvestris L. (K.)

D i p t e r a (dvoukřídli), čeleď Cecidomyiidae (bejlomorky)

Boucheella artemisiae (Bché) na Artemisia campestris L. (K.)

Anisostephus betulinum (Kieff.) na Betula verrucosa Ehrh. (K.)

Mikila fagi (Htg.) na *Fagus silvatica* L. (K.)
Cecidomyidon (Buhr 2671) na *Fagus silvatica* L. (K.)
Dasyneura laricis (F.Lw.) na *Larix europaea* Dl. (K.)
Harmandia loewi (Rübs.) na *Populus tremula* L., Elbląg v Mazu-
 rách a v Puszcze Kampinoskiej u Varšavy. (T.)
Lasioptera rubi (Schrank) na *Rubus fruticosus* L. a s Neurote-
rus fumipennis Htg. v Puszcze Kampinoskiej u Varšavy. (T.)
Teomyia major (Kieff.) na *Salix aurita* L. v Puszcze Kampinos-
 kiej u Varšavy. (T.)
Didymomyia reaumuriana (F.Lw.) na *Tilia cordata* Mill. v Puszcze
 Kampinoskiej u Varšavy. (T.)
Physemocecis ulmi (Kieff.) em. Rübs. na *Ulmus montana* Stokes.
 (K.)
Jaspiella myrtilli Rübs. na *Vaccinium vitis-idaea* L. spolu
 s mykocecidii Exobasidium vaccinii (Fuck.)-(K.).

ZUR VERBREITUNG DER GALLEN IN POLEN

Es werden Funde von Gallen angegeben, welche sich im von Prof. Dr. A. Kalandra und Dr. F. J. Turček im Jahre 1954 in Polen gesammelten Materiale befanden.

LITERATURA

B u h r H. (1964-1965): Bestimmungstabellen der Gallen (Zoo- und Phytocecidien) an Pflanzen Mittel- und Nordeuropas. Jena.

BLAPS ABBREVIATA MÉN.- NOVÝ DRUH POTEPLNÍKA PRO ČESKOSLOVENSKO (COL., TENEBRIONIDAE)

Jaroslav P i c k a

Blaps abbreviata byl popsán Ménétriesem v Bull. Acad. Petr I, I., 1836: 150 z Turecka. Je znám ze Sýrie, Malé Asie, Balkánského poloostrova, z Rakouska (Seidlitz 1898) a z Maďarska (Csiki 1902).

V červnu 1964 jsem našel 1 ♀ na vinici u Štúrova na jižním Slovensku, v červnu 1966 další exemplář (♂) na Hegyfaroku