

Mikila fagi (Htg.) na *Fagus silvatica* L. (K.)
Cecidomyidon (Buhr 2671) na *Fagus silvatica* L. (K.)
Dasyneura laricis (F.Lw.) na *Larix europaea* Dl. (K.)
Harmandia loewi (Rübs.) na *Populus tremula* L., Elbląg v Mazu-
 rách a v Puszcze Kampinoskiej u Varšavy. (T.)
Lasioptera rubi (Schrank) na *Rubus fruticosus* L. a s Neurote-
 rus fumipennis Htg. v Puszcze Kampinoskiej u Varšavy. (T.)
Teomyia major (Kieff.) na *Salix aurita* L. v Puszcze Kampinos-
 kiej u Varšavy. (T.)
Didymomyia reaumuriana (F.Lw.) na *Tilia cordata* Mill. v Puszcze
 Kampinoskiej u Varšavy. (T.)
Physemocecis ulmi (Kieff.) em. Rübs. na *Ulmus montana* Stokes.
 (K.)
Jaspiella myrtilli Rübs. na *Vaccinium vitis-idaea* L. spolu
 s mykocecidii Exobasidium vaccinii (Fuck.)-(K.).

ZUR VERBREITUNG DER GALLEN IN POLEN

Es werden Funde von Gallen angegeben, welche sich im von Prof. Dr. A. Kalandra und Dr. F. J. Turček im Jahre 1954 in Polen gesammelten Materiale befinden.

LITERATURA

B u h r H. (1964-1965): Bestimmungstabellen der Gallen (Zoo- und Phytocecidien) an Pflanzen Mittel- und Nordeuropas. Jena.

BLAPS ABBREVIATA MÉN.- NOVÝ DRUH POTEPLNÍKA PRO ČESKOSLOVENSKO (COL., TENEBRIONIDAE)

Jaroslav P i c k a

Blaps abbreviata byl popsán Ménétriesem v Bull. Acad. Petr I, I., 1836: 150 z Turecka. Je znám ze Sýrie, Malé Asie, Balkánského poloostrova, z Rakouska (Seidlitz 1898) a z Maďarska (Csiki 1902).

V červnu 1964 jsem našel 1 ♀ na vinici u Štúrova na jižním Slovensku, v červnu 1966 další exemplář (♂) na Hegyfaroku

u Štúrova. Ve sbírce J.Gottwalda jsem zjistil 1 ♂ s lokalitou Gbelce (Sobota leg.) a ve sbírce A.Olexy 1 ♀, kterou sbíral u Kováčova r. 1952.

U nás se Blaps abbreviata vyskytuje spolu s ostatními druhy rodu na obvyklých biotopech. Výskyt na jižním Slovensku je pravděpodobně nejsevernější hranicí rozšíření tohoto mediterránního druhu.

BLAPS ABBREVIATA MÉN. - EINE NEUE TENEBRIONIDENART IN
DER TSCHECHOSLOWAKEI (COL.)

Blaps abbreviata Mén. wurde in vier Stücken in der Südslo-
wakei als neu für das Gebiet der Tschechoslowakei festgestellt.
Die Art erreicht in diesem Gebiet wohl die nördlichste Grenze
ihres Areals.

LITERATURA

C s i k i E., 1902: Rovartani Lapok, 9: 50. S e i d l i t z
G., 1898: Nat. Ins. Deutsch., 5: 329.

L I T E R A T U R A

W o l f s b e r g e r Josef: Die Macrolepidopteren-Fauna
des Gardaseegebietes. - Memorie del Museo Civico di Storia Na-
turale, Verona. 385 str., 39 obr., 16 tab. Verona 1966. Cena
4.000 Lit.

Přestože Gardské jezero a jeho nejbližší okolí patří k zoo-
geograficky nejvýznamnějším oblastem, neboť tu řada živočichů
dosahuje severní hranice svého rozšíření, byl tu řád Lepidoptera
až do současnosti takřka neprobádán. S hlediska výskytu motýlů
se nejbližším okolím jezera zabýval pouze Kilian (1916) a Dan-
nehl (1925-30).

Právě uveřejněná monografie Wolfsbergerova je nejobsáhlej-
ším zpracováním motýlů jihoalpské oblasti vůbec. Autor zjistil
v nejbližším okolí jezera a v přilehlém údolí řeky Sarca celkem
1139 druhů motýlů skupiny "Makrolepidoptera". Materiál byl sbí-